



果胶铋联合阿莫西林对幽门螺杆菌相关胃炎治疗的价值分析

王提名

(湖南省平江县妇幼保健计划生育服务中心 湖南岳阳 414500)

摘要：目的：探讨将果胶铋联合阿莫西林治疗应用于幽门螺杆菌相关胃炎的效果。方法：选择我院中 2016 年 11 月至 2017 年 9 月间收治的幽门螺杆菌相关胃炎患者 118 例作为研究对象，按照患者入院日期单双号，将其分为对照组和实验组，每组中均含有 59 例患者；对照组患者根据病症采用阿莫西林治疗方案，而实验组患者则在对照组的药物治疗方案基础上，加入果胶铋联合治疗，对比两组患者的治疗效果。结果：实验结果显示，实验组患者的效果明显高于对照组，症状改善更为良好，组间差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)，具有可比性。结论：将果胶铋联合药物联合治疗应用于幽门螺杆菌相关胃炎患者的治疗中，具有良好的治疗效果，能够有效改善患者的临床病症，具有良好的应用效果，值得在临床上推广使用。

关键词：果胶铋；阿莫西林；幽门螺杆菌相关胃炎；治疗方案

中图分类号：R256.12

文献标识码：A

文章编号：1009-5187 (2018) 06-023-01

幽门螺杆菌相关胃炎是一种临床上常见的消化系统疾病，其主要原因是由于患者胃肠道受到幽门螺杆菌影响，患者出现消化不良。患者临床表现为上腹部疼痛、餐后饱胀、上腹部有明显灼烧感等；同时，部分患者还会出现焦虑和失眠等精神异常症状，对患者的身心都会造成极大的影响[1]。所以在临床上也需要选择合适的治疗方案，对患者进行治疗，才能保证患者恢复正常生理功能，提高患者生活质量[2]。本次研究中，选择我院中 2016 年 10 月至 2017 年 8 月间收治的幽门螺杆菌相关胃炎患者 118 例作为研究对象，探究将果胶铋联合药物联合治疗应用于幽门螺杆菌相关胃炎的效果，取得了一定成果，现报道如下。

1 一般资料与方法

1.1 一般资料

选择我院中 2016 年 11 月至 2017 年 9 月间收治的幽门螺杆菌相关胃炎患者 118 例作为研究对象，按照患者入院日期单双号，将其分为对照组和实验组，每组中均含有 59 例患者；对照组中包括男性患者 32 例，女性患者 27 例，患者年龄为 25-61 岁，患者平均年龄为 (42.6 ± 7.6) 岁；实验组中包括男性患者 29 例，女性患者 30 例，患者年龄为 26-60 岁，患者平均年龄为 (43.1 ± 8.1) 岁。所有患者在一般资料上无明显差异，不具有统计学意义 ($P < 0.05$)，具有可比性。

1.2 方法

对照组患者根据患者的不同状况，采用药物治疗方案。患者如有腹胀症状，应用阿莫西林胶囊进行治疗，用药方式为口服用药，1.0g/次，2次/日。

实验组患者在此基础上将果胶铋应用于治疗中。用药为胶体果胶铋片，0.1g/次，2次/日。

1.3 评价标准

痊愈：患者临床症状基本消失，经血常规检测未发现异常，并且治疗后无复发现象。有效：患者临床症状有明显好转，腹痛、腹胀症状有所改善，经血常规检测未发现异常，并且治疗后无复发现象。无效：患者临床症状未见好转，经血常规检测，依旧发现炎症或其他异常状况，或在治疗完成后有复发现象。

1.4 统计学方法

所有患者的临床基础资料均用统计学软件 SPSS17.0 或是 SPSS19.0 处理，其中总有效率与不良反应发生情况等计数资料用率 (%) 的形式表达，数据采取卡方检验，计量资料用 (均数 ± 标准差) 的形式表示，并采取 t 检验，若 $p < 0.05$ ，则证明统计学意义存在。

2 结果

实验结果显示，实验组患者的效果明显高于对照组，症状改善更为良好，实验组患者的治疗总有效率为 94.92%，而对照组患者的治疗总有效率为 64.41%，组间差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)，具有可比性。

表 1 两组患者治疗有效性对比

组别	痊愈	有效	无效	总有效率
----	----	----	----	------

对照组 (n=59)	23	15	21	64.41%
实验组 (n=59)	39	17	3	94.92%

3 讨论

幽门螺杆菌相关胃炎是一种临床上十分常见的胃部疾病，主要会导致患者胃酸分泌增加、胃肠动力紊乱、内脏敏感性增高等[3]。患者胃酸的分泌也会导致患者胃排空的时间延迟，甚至还可能引起患者胃黏膜上皮细胞内形成空洞，进而影响患者为局部神经功能，使其出现异常或形态学上的改变，最终引起患者上腹部不适[4]。果胶铋联合药物联合治疗是一种临床上常用的治疗方案，主要是通过果胶铋和药物联用，对幽门螺杆菌相关胃炎致病菌进行根除，在临床上取得了较好的治疗效果。

但值得注意的是，随着近年来抗生素的应用，各种抗生素药物对致病菌的治疗效果也有所降低，所以在进行治疗时，还需要加用果胶铋进行治疗[5]。果胶铋治疗能够有效清除患者的胃部坏死组织，改善患者幽门螺杆菌相关胃炎周围的环境，使患者的正常组织粘膜能够得到愈合，提高微血管的重建效果，具有十分积极的应用意义。

阿莫西林与果胶铋治疗是两种临床上常用的治疗方案，主要是通过两种药物联用，对幽门螺杆菌进行根除，在临床上取得了较好的治疗效。本次研究中所使用的胶体果胶铋与溃疡面及炎症表面有强的亲和力和，可在胃黏膜表面形成一层牢固的保护膜，增强胃黏膜的屏障作用，因此胶体果胶铋对消化性溃疡和慢性胃炎有较好的治疗作用。但值得注意的是，随着近年来抗生素的应用，多种抗生素联用的方案的治疗效果也有所降低，所以在进行治疗时，需要根据患者的具体临床症状和个体状况，选择相应的抗生素进行治疗，才能保证患者的治疗效果。

本次研究结果显示，实验组患者的效果明显高于对照组，症状改善更为良好，实验组患者的治疗总有效率为 94.92%，而对照组患者的治疗总有效率为 64.41%，组间差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)，具有可比性。

实验结果说明，将果胶铋联合药物联合治疗应用于幽门螺杆菌相关胃炎患者的治疗中，具有良好的治疗效果，能够有效改善患者的临床病症，具有良好的应用效果，值得在临床上推广使用。

参考文献：

- [1]边志锋.果胶铋联合药物治疗幽门螺杆菌相关胃炎的临床效果分析[J].海峡药学,2017,29(11):169-170.
- [2]邢昌范.果胶铋联合药物在幽门螺杆菌相关胃炎临床治疗中的效果[J].世界最新医学信息文摘,2016,16(75):59-64.
- [3]徐柏兴.果胶铋联合药物治疗幽门螺杆菌相关胃炎疗效观察[J].深圳中西医结合杂志,2015,25(23):134-136.
- [4]王瑞彩.果胶铋联合药物治疗幽门螺杆菌相关胃炎的临床疗效观察[J].中国现代药物应用,2015,9(12):144-145.
- [5]辛红波,张秋芹,成波.果胶铋联合药物治疗幽门螺杆菌相关胃炎患者的疗效分析[J].中国处方药,2014,12(02):25-26.