

毒品与艾滋发生的关系及预防

张蕊蝶¹ 李林峰¹ 丁黎雯² 郭琪¹ 何殊瑶¹

川北医学院 1 临床医学系 2 管理学院 四川南充 637000

〔摘要〕目的 讨论毒品与艾滋发生的关系及预防,为探索毒品和艾滋之间的相关因素提供参考因素。方法 自填式问卷法研究对象:兴文县居民。回收有效问卷 298 份,有效问卷回收率为 98.73%,问卷包括一般身份资料,对毒品的认识程度,对艾滋病的了解程度等的调查问卷。结果 大多数人能对毒品和艾滋病有良好的认识,但部分人群对于毒品和艾滋病的认识比较薄弱。结论 对毒品认识薄弱的人通常对艾滋病也没有较为清楚的认识,有潜在的染上毒品和传染艾滋病的可能性。

〔关键词〕艾滋;毒品;兴文

〔中图分类号〕R193 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165(2018)05-0038-01

0 引言

在毒品和艾滋方面,我国一直是高度重视,无论是在走私、制毒、贩毒或其他进行毒品交易,都有相关的刑法,公安机关也大力地禁毒;2004年,国家出台了“四免一关怀”政策,为艾滋病患者的生存和医疗提供援助,此外宣传艾滋病等让社会更了解艾滋病,自身避免被传播。在国家大力整治毒品,防止艾滋传播的情况下,兴文县位处川滇黔结合部,其艾滋与毒品仍是需要重视的问题,在这种情况下,兴文县政府也出台了相关地方政策,进行禁毒宣传,开展禁毒大排查力求创造“无毒乡镇”,希望通过本次问卷,能更准确的知道兴文县毒品与艾滋出现的原因,了解政府禁毒宣传艾滋病的情况,为兴文县在以后的禁毒工作提供帮助。

1 对象及方法

1.1 调查对象

某县少数民族聚集区随机采访当地群众,被抽取的群众即为调查对象。

1.2 调查内容

艾滋病包括:①基本信息(含性别、年龄、工作情况、民族、婚姻状况、文化程度、长期居住地、月收入)。②对艾滋病相关知识的了解情况(含艾滋病的特点、传播途径、易感人群及国家相关政策等)。③艾滋病相关知识的获取途径(含对开设艾滋病预防教育课的态度、获取艾滋病和性行为相关知识的途径)。④对艾滋病的相关态度和行为的看法(含对艾滋病患者的态度、对艾滋病病毒抗体检测的接受程度、性行为和商业性行为、安全套的使用情况)。

毒品包括:①基本信息(含性别、年龄、民族、职业、文化程度、家庭居住地、是否为独生子女)。②对毒品及其影响的态度和了解情况(含毒品种类、毒品成瘾问题的态度、毒品的危害)。③对周围人吸食毒品的态度。

1.3 调查方法

在 2018 年 7.18-7.23,调查员在学校、街道、办公楼等地对调查对象动员讲解调查目的、内容及意义,通过扫描二维码邀请调查对象进行电子档问卷的填写。

1.4 统计学方法

剔除无效问卷后,采用 Epidata3.1 进行数据录入,再用 SPSS19.0 软件进行数据分析。

2 讨论与建议

通过数据分析不难发现兴文县对于不管是艾滋还是毒品的健康宣传,预防干预等工作都相对薄弱。居民对于感染艾滋病与毒品的关系更是所知甚少。因此,加强防艾滋与防毒品的宣传,定时地走进社区学校进行健康宣传,艾滋病与毒品常识宣传,鼓励居民适当关注自己的身体健康起着重要作用。本研究分析宜宾市兴文县对艾滋病与毒品关系的认知度以及艾滋病的预防,并由此提出相关建议。希望能对以后的研究提供参考,并能减少艾滋病的感染。建议如下:

1. 由于兴文县幅员辽阔,且人员分散,交通不便,人口流动性较大,增加了艾滋病的控制难度。人员文化程度普遍偏低,地区方言较重,存在部分感染者拒绝检测与治疗。所以强化疾控中心的职责尤其重要,定时定点的进行 HIV 检测,政府应联合公安加强打击毒品的工作,切断一条艾滋传染的通道。

2. 加强宣传,走进基层学校与居委会,进行艾滋讲座以及健康常识的宣传,让人们从根本上认识艾滋从而得以预防艾滋,正确看待艾滋。

3. 鼓励社会各界人士参与艾滋病防控工作,通过社会各界进行宣传以及对于艾滋病人关怀的行动来降低艾滋病的发生。

3 结论

1. 大多数人能对毒品和艾滋病有较为良好的认识,少部分人对此持无所谓的态度。

2. 在对毒品认识方面,对于一些化学名称如美沙酮等大多数人无法分辨。

3. 在毒品与艾滋病的联系方面有相当一部分人认为其无紧密联系。

“结论”:毒品与艾滋病的认识宣传工作在其多发地区还有待加强和深入。

〔参考文献〕

[1] 廖斌,李怡,李婕,梁军,胡斌,赵山平.昆明市羁押场所毒品滥用者艾滋病干预影响因素分析[J].卫生软科学,2018,32(06):68-73.

[2] 余琳,王仁利,白双,张石则,董玲玲,归冰,杨宏,沈进,宛小燕.凉山州艾滋病重点地区中学生毒品认知及影响因素研究[J].四川大学学报(医学版),2018,49(03):463-468.