

整体护理在急诊急救护理中的应用效果

李游莉 赵 春

龙泉驿区第一人民医院·四川大学华西医院龙泉医院 四川成都 610100

〔摘 要〕目的 探讨整体护理在急诊急救护理中的应用效果。方法 入选 2017 年 1 至 12 月急诊急救患者 80 例，随机分成观察组 (n=40) 和对照组 (n=40)，分别实施整体护理和常规急诊护理。结果 观察组各个急救环节所花费的急救时间，都要明显比对照组更短， $P<0.05$ ；且观察组的急救成功率，也明显比对照组更高， $P<0.05$ 。观察组患者及家属对各项急诊急救护理工作的满意度评分，都要明显比对照组更高， $P<0.05$ 。结论 整体护理能够提高急诊急救护理效率，提高急救成功率，提高患者的急诊急救护理满意度。

〔关键词〕整体护理；急诊急救；护理效率；护理满意度

〔中图分类号〕R473 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165 (2018) 06-151-02

0 前言

急诊科接诊的均为病情危重或伤情严重的患者，对于这些患者来说，不仅要对其实施及时有效的急救处理，同时需要配合有效的急诊急救护理干预，才能够提高急诊急救工作效率和急诊急救效果，从而挽救患者的生命、挽救患者的健康^[1]。鉴于此，为了进一步完善和提高我院的急诊急救护理质量，将整体护理应用到了急诊急救护理中，获得了良好的应用效果。

1 资料与方法

1.1 基本资料

共入选 2017 年 1 至 12 月时间段以急诊方式来我院急诊科进行急救的各类患者 80 例，以国际随机数字表法分组，划分成观察组 (n=40) 和对照组 (n=40)。观察组 40 例患者，包括男 22 例，女 18 例；其年龄为 21-76 岁，平均年龄 (56.8±5.9) 岁。对照组 40 例患者，包括男 20 例，女 20 例；其年龄为 22-74 岁，平均年龄 (57.5±6.4) 岁。两组研究对象各项资料的统计学比较，不存在统计学意义 $P>0.05$ 。该研究在立项前上报并经过了伦理委员会的同意和批准。

1.2 护理方法

1.2.1 观察组 (n=40) 和对照组 (n=40) 分别实施整体护理和常规急诊护理，整体护理如下：

1.2.1.1 院前急救护理

院前护理的关键在于争取抢救时间，帮助患者尽快脱离危险。因此护理人员要在第一时间对患者的生命体征、意识

情况进行准确的评估和掌握，并给予实时监测。并在较短的时间内，对患者的病情进行进一步的掌握，同时形成后续急救处理方案。给予患者基本的急救干预，包括保持呼吸道通畅、纠正缺氧、及时止血等。完成以上护理干预之后，则要对患者实施安全转运。

1.2.1.2 急诊室急救护理

患者进入急诊室后，随时监测生命体征，并针对患者的临床症状或受伤部位给予针对性处理。借助各种医疗设备和器械对患者进行有效的急救干预，包括建立静脉通路、气管插管等。并在急救实施过程中，关注患者的心理状况，给予及时的安慰和鼓励。

1.2.1.3 急救后护理

完成急救后对患者进行 24h 观察，待其病情稳定则转入普通病房。

1.3 统计学方法

使用 SPSS17.0 进行数据分析，以 (均数 ± 标准差) 表示计量资料，行 t 检验，以 (%) 表示计数资料，行 χ^2 检验。结果以 $P<0.05$ 为比较差异存在统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的急救效率和急救效果比较

观察组患者在各个急救环节所花费的急救时间，都要明显比对照组患者更短， $P<0.05$ 比较差异具有统计学意义；且观察组患者的急救成功率，也明显比对照组患者更高， $P<0.05$ 比较差异具有统计学意义。见表 1：

表 1：两组患者的急救效率和急救效果比较

组别	分诊评估时间 (min)	心电监护时间 (min)	静脉采血时间 (min)	静脉用药时间 (min)	治疗时间 (min)	急救成功率 [n (%)]
观察组 (n=40)	0.71±0.20	4.30±1.07	3.19±1.10	4.16±1.35	65.73±5.14	40 (100.0)
对照组 (n=40)	2.35±0.56	8.39±1.20	5.32±1.04	7.52±2.58	72.58±6.01	36 (90.0)

2.2 两组急诊患者及其家属的急诊护理满意度评分比较

观察组患者及家属对各项急诊急救护理工作的满意度评分，都要明显比对照组患者更高， $P<0.05$ 比较差异具有统计学意义。见表 2：

3 讨论

对于急诊急救患者来说，由于其病情较为多样化，加之

其病情危急，因此如果在短时间内得不到有效救治的话，会导致其生命健康受到威胁^[2]。因此，急诊急救护理难度较大，不仅患者数量众多，且危重患者集中，突发性较强。因此，如何争取急救时间就成为了能否急救成功的一个重要因素^[3]。鉴于此，急诊科必须配合实施有效的护理干预手段，由于常 (下转第 154 页)

表 1: 两组护理评分对比

项目	术前	术中	术后	护理总体质量
对照组 (n=45)	5.35±0.84	5.03±0.71	4.87±0.62	5.08±0.72
试验组 (n=45)	9.08±1.13	8.75±0.96	9.16±0.58	9.00±0.89

表 2: 两组满意度状况对比

项目	不满意	满意	十分满意	满意度
对照组 (n=45)	10 (22.22)	12 (26.67)	23 (51.11)	35 (77.78)
试验组 (n=45)	3 (6.67)	6 (13.33)	36 (80.00)	42 (93.33)

及精神的治疗与护理要求^[4]。在本文研究中,两组相较而言,试验组术前、术中、术后护理评分及护理总体质量评分均较优($P < 0.05$),试验组满意度更佳(93.33%vs. 77.78%)($P < 0.05$)。

综上所述,在手术室采取细节护理,可以提升护理质量与满意度,促进患者身体康复,因此能够大力实践与推广。

[参考文献]

[1] 施巧微. 细节护理对手术室护理质量及手术患者满意

度的影响[J]. 临床合理用药杂志, 2016, 912:168-169.

[2] 吴敏. 细节护理对手术室护理质量及手术患者满意度的影响[J]. 基层医学论坛, 2017, 2108:1000-1001.

[3] 陈世蓉. 细节护理对手术室护理质量及手术患者满意度的影响[J]. 中国继续医学教育, 2017, 923:223-225.

[4] 林丽玲, 杨爱梅. 细节护理对手术室护理质量及患者满意度的影响分析[J]. 基层医学论坛, 2018, 2215:2050-2052.

(上接第 151 页)

表 2: 两组急诊患者及其家属的急诊护理满意度评分比较(分)

护理质量评分指标	观察组 (n=40)	对照组 (n=40)
健康教育	9.78±0.21	8.03±0.33
治疗性护理	9.89±0.19	8.20±0.44
服务态度	9.72±0.16	7.99±0.36
心理护理	9.91±0.09	8.00±0.44

规的急诊护理,已无法满足患者的护理需求,且无法更进一步提升护理效率,缩短急救时间,因此,急诊急救护理必须进行有效的改革。

整体护理是一种人文主义护理模式,护理过程中秉承“以患者为中心”的护理理念,对患者进行身心的全方位护理干预;秉承“时间就是生命”的原则,在最短的时间内对患者的病情进行初步的评估、掌握,并形成后续护理方案^[4]。整体护

理在急诊急救护理中就被动护理转变为主动护理,并积极争取时间,提高急救效率^[5]。

本次研究中,将整体护理应用到急诊急救护理中,显著缩短了患者的各项急救时间,从而显著提升患者的急救效果,获得患者更高的急诊急救护理满意度。

[参考文献]

[1] 社会勇. 整体护理在急诊急救护理工作中应用效果[J]. 包头医学院学报, 2016, 32(05): 144-146.

[2] 李秀纯. 急诊危重症患者实施整体性急诊急救护理的效果[J]. 医疗装备, 2016, 14(17): 187-188.

[3] 夏媛. 整体护理在急诊急救护理工作中的应用分析[J]. 系统医学, 2017, 02(02): 133-136.

[4] 社会勇. 整体护理在急诊急救护理工作中应用效果[J]. 包头医学院学报, 2016, 32(05): 144-146.

[5] 宋欢欢. 急诊急救护理工作中整体护理的应用价值分析[J]. 医药前沿, 2016, 6(21): 303-304.

(上接第 152 页)

早产儿的护理首先要保证病房的环境舒适,尽量减少对早产儿的刺激,然后再进行舒适护理,对早产儿家属宣传护理知识,重点说明在护理过程中的注意事项^[3]。一般来说,早产儿与正常出生的新生儿相比,适应能力与器官发育要比较差,所以要充分的营养补充^[4]。

本文为了探究发展性照顾在新生儿重症监护室早产儿护理中的运用效果,选取我院重症监护室 2017 年 3 月-2018 年 7 月收治的早产儿 126 例为研究对象,随机将其均分为对照组和观察组。其中对照组早产儿实施常规护理,观察组早产儿在常规护理的基础上进行发展性照顾。结果表明:观察组早产儿每天进奶量和平均增加体质量要多于对照组,而平均住院时间少于对照组, $P < 0.05$,两组数据差异明显,具有统计学意义;观察组的不良反应发生率(1.59%)远低于对照组的 15.87%, $P = 0.026$, $t = 4.869$,组间数据差异明显,具有统计学意义。与其他研究人员的研究结果进行比较,我院护理早产儿的不良反应发生率为 1.59%,低于其他学者的 6.6%,有

更好的护理效果。

综上所述,通过对重症监护室早产儿患者在常规护理的基础上实施发展性照顾,不仅可以提高患儿的恢复情况,还可以降低不良反应发生率,对于早产儿患者具有重要的临床意义。

[参考文献]

[1] 陈燕. 发展性照顾在新生儿重症监护室早产儿护理中的应用效果观察[J]. 临床合理用药杂志, 2016, 9(27):172-173.

[2] 闻秀琴. 发展性照顾在新生儿重症监护室早产儿护理中的应用效果评价[J]. 中国社区医师, 2017, 33(23):134-134.

[3] 张菁华. 浅析发展性照顾护理模式在新生儿重症监护室护理中的应用效果[J]. 医药卫生:引文版, 2016(2):124-124.

[4] 彭培畔. 发展性照顾护理模式应用于新生儿重症监护室护理中的效果[J]. 医疗装备, 2018(4):175-176.

[5] 封岚岚, 田腊玉, 孙燕. 新生儿重症监护室早产儿护理中实施发展性照顾的意义[J]. 当代医学, 2017, 23(36):175-177.