

颅脑外伤术后的重症监护室护理探究

胡 芳

浙江大学医学院附属第二医院 浙江杭州 310000

〔摘 要〕目的 探究颅脑外伤术后的重症监护室护理的应用效果。方法 选取我院 2017 年 2 月 - 2018 年 5 月收治的 96 例颅脑外伤患者为研究对象,按照随机抽样的方法,将患者分为对照组和观察组,每组 48 例,其中对照组患者进行常规护理,观察组患者实施重症监护护理,对两组患者术后并发症发病率进行比较。结果 对照组患者术后并发症发病率为 18.14%, 远高于观察组的 3.15%, $P=0.031$, $t=4.624$, 对照组和观察组数据差异明显,具有统计学意义。结论 对颅脑外伤患者进行重症监护室护理,可以明显降低术后并发症发病率,对于颅脑外伤患者的临床治疗具有重要意义。

〔关键词〕颅脑外伤;重症监护;并发症;临床治疗

〔中图分类号〕R473.6 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165 (2018) 06-136-02

颅脑损伤是指钝器和锐器等对人颅脑造成各类损伤,损伤原因包括钝器、锐器、坠伤和跌伤,因损伤的力度不同,对患者损伤程度也不同。损伤入院后需要对损伤程度进行检查,以便制定合理的治疗方案,检查手段包括 X 线平片、CT 检查和腰椎穿刺。本文选取我院 2017 年 2 月 - 2018 年 5 月收治的 96 例颅脑外伤患者为研究对象,探究颅脑外伤术后的重症监护室护理的应用效果。具体研究内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将我院 2017 年 2 月 - 2018 年 5 月收治的 96 例颅脑外伤患者为研究对象,按照随机抽样的方法,将患者分为对照组和观察组,每组 48 例。本研究在征得患者及其患者家属同意下进行,并经过伦理委员会批准。其中对照组男性患者 32 例,女性患者 16 例,年龄在 37-69 岁,平均年龄为 (45.16 ± 6.28) 岁,病程为 3-9 个月,平均病程为 (4.62 ± 0.37) 个月,体重为 49.37-81.64Kg,平均体重为 (62.18 ± 5.17) Kg; 观察组男性患者 34 例,女性患者 14 例,年龄在 34-64 岁,平均年龄为 45.24 ± 6.17 岁,病程为 4-9 个月,平均病程为 (4.52 ± 0.41) 个月,体重为 50.59-78.57Kg,平均体重为 (61.57 ± 5.27) Kg。两组患者在性别和年龄等方面差异均不明显,无统计学意义 ($P > 0.05$),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 常规护理

对照组颅脑外伤患者通过常规护理进行治疗,首先需要对患者进行全面身体生命体征检查,并治疗全程监测,检查项目包括血压、血糖、尿液等各方面。要监督患者按时用药,并保持病房的干净卫生。

1.2.2 重症监护室护理

观察组颅脑外伤患者实施重症监护室护理,在重症监护室中通过各类先进的仪器,周到细致的护理服务,对患者进行安全高效的护理。应用先进的诊疗手段、检测方法、监护理念,对患者病情进行连续的定性和定量观察,并进行详细的记录,另外还需要一些特定的干预措施,预防术后并发症的出现,最大程度的改善患者的生活治疗。

1.3 评定指标

对照组患者进行常规护理,观察组患者实施重症监护护理,评定指标为术后并发症发病率,并发症统计范围包括泌尿系统感染、肺部感染和压疮。

1.4 统计学处理

应用 SPSS18.0 统计软件进行数据分析。数据以率 (%) 表示,计量资料采用 t 检验,各组间差异比较采用方差分析和 χ^2 检验, ($P < 0.05$) 表示数据之间的差异具有显著的统计学意义。

2 结果

由表 1 可知,对照组患者不论是泌尿系统感染,还是肺部感染和压疮都有不同程度的发病,而观察组仅仅出现 1 例泌尿系统感染。颅脑外伤患者在术后非常容易发生各类感染,通过合理的护理方法可以有效降低患者发生感染的概率。重症监护护理是最为高效的一种护理方法,可以明显降低患者术后并发症发病率。

观察组发病率为 2.08%, 远低于对照组的 22.92%, $P=0.031$, $t=4.624$, 对照组和观察组数据差异明显,具有统计学意义。

表 1: 对照组和观察组颅脑外伤患者术后并发症发病率比较

组别	例数	泌尿系统感染	肺部感染	压疮	发病率 (%)	P	t
对照组	48	5	4	2	22.92	0.031	4.624
观察组	48	1	0	0	2.08		

3 讨论

近年来,医疗技术水平不断提高,重症监护护理也走上了正规化的道路,重症监护室(Intensive Care Unit)是一种现代化医疗技术的集中表现形式,不但配有床边监护仪、

中心监护仪、多功能呼吸治疗机和起搏器等多台先进的医疗设备,还有专业高效的护理团队。根据重症监护的患者病情不同,可以分为小儿重症监护病房(PICU)、新生儿重症监 (下转第 139 页)

较优 ($P < 0.05$)。

表 1: 两组术后 6h 疼痛指数对比

项目	I 级	II 级	III 级
对照组 (n=25)	3 (12.0)	16 (64.0)	6 (24.0)
试验组 (n=25)	9 (36.0)	14 (56.0)	2 (8.0)

2.2 两组恢复时间指标对比

表 2: 两组恢复时间指标对比

项目	住院时间 (d)	肠功能恢复 时间 (h)	下床时间 (h)
对照组 (n=25)	9.3±1.5	75.0±19.0	39.5±4.6
试验组 (n=25)	6.5±1.2*	29.0±9.0*	31.8±3.9*

由表 2, 可知: 两组相较而言, 试验组住院、肠功能恢复及下床时间均较短 ($P < 0.05$)。

3 讨论

在女性生殖系统中, 子宫肌瘤是一种发病率较高的良性肿瘤。手术方式多依据患者临床病况与对生育功能的要求。

整体而言, 此种手术为侵入性操作, 极易导致患者出现心理、生理应激, 不利于手术与麻醉实施, 更影响术后恢复, 所以加强围手术期的护理意义重大^[4]。本文研究中, 两组相较而言, 试验组术后 6h 疼痛程度较优 ($P < 0.05$), 试验组住院、肠功能恢复及下床时间均较短 ($P < 0.05$)。

综上所述, 在子宫肌瘤围手术期施以针对性护理干预, 可以有效减轻患者疼痛, 加快恢复速度, 因此能够大力实践与推广。

[参考文献]

- [1] 沈萍. 探讨针对性护理干预在子宫肌瘤围手术期的临床应用效果 [J]. 实用临床护理学电子杂志, 2017, 250:113+121.
- [2] 唐睿. 针对性护理干预在子宫肌瘤围手术期的效果探讨 [J]. 中外女性健康研究, 2018, 05:153+187.
- [3] 刘明芳. 针对性护理干预在子宫肌瘤围手术期的效果观察 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2018, 1837:219-220.
- [4] 戴菲菲. 针对性护理干预在子宫肌瘤围手术期的效果探讨 [J]. 实用妇科内分泌杂志 (电子版), 2018, 503:37-38.

(上接第 136 页)

护病房 (NICU)、内科重症监护病房 (MICU)、心血管重症监护病房 (CCU) 和心脏外科重症监护病房 (CICU)。重症监护护理人员 24 小时对患者进行全程密切的监控, 对患者进行细致和耐心的护理, 最大程度的减轻患者身体上的伤痛。

本文为了探究颅脑外伤术后的重症监护室护理的应用效果, 选取我院 2017 年 2 月-2018 年 5 月收治的 96 例颅脑外伤患者为研究对象, 按照随机抽样的方法, 将患者分为对照组和观察组, 每组 48 例, 其中对照组患者进行常规护理, 观察组患者实施重症监护护理, 结果表明: 对照组患者术后并发症发病率为 18.14%, 远高于观察组的 3.15%, $P=0.031$, $t=4.624$, 两组数据差异明显, 具有统计学意义。

综上所述, 颅脑外伤患者通过实施重症监护室护理, 可以明显降低术后并发症发病率, 值得在广大医院中进行临床研究与推广。

[参考文献]

- [1] 刘晓斐. 颅脑外伤术后的重症监护室护理分析 [J]. 中外女性健康研究, 2016(19):91-92.
- [2] 汤灿, 董伦, 张恒柱, 等. 重型颅脑外伤患者术后早期营养支持策略的选择与疗效分析 [J]. 国际外科学杂志, 2017, 44(1):11-15.
- [3] 龙秀菊. 重症监护室颅脑外伤患者医院感染的循证护理分析 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2016, 16(60):296-297.
- [4] 尹佃芬. 分级护理在重症监护病房重症颅脑外伤患者中的应用效果分析 [J]. 中外女性健康研究, 2016(2):74-75.
- [5] 张悦, 于晓江. 优质护理在 ICU 重型颅脑外伤患者认知功能恢复及感染预防中的作用 [J]. 实用临床医药杂志, 2017, 21(4):78-81.
- [6] 贾惠芬, 徐炎. 现实定向训练在中重度颅脑外伤患者早期康复治疗中的应用疗效 [J]. 当代护士, 2017(12):53-56.

(上接第 137 页)

蛋白和水分进行治疗; 激素治疗是选择中效制剂对患者病情进行治疗; 通过免疫抑制剂进行治疗和控制血压进行治疗。

本文为了探究血液净化治疗儿童肾病综合征难治性水肿的临床护理效果, 选取我院 2014 年 6 月-2018 年 6 月收治的 126 例儿童肾病综合征难治性水肿患者为研究对象, 随机将其分为对照组和观察组, 每组 63 例。其中对照组患者实施一般性护理, 观察组患者在一般性护理的基础上进行专科护理。结果表明: 对照组患者术后并发症发病率为 19.05%, 高于观察组的 3.17%, $P=0.028$, $t=5.312$, 两组数据差异明显, 具有统计学意义; 观察组患者术后满意度 (96.83%) 远高于对照组的 76.19%, $P=0.032$, $t=4.856$, 组间数据差异明显, 具有统计学意义。

综上所述, 通过对儿童肾病综合征难治性水肿患者在一般性护理的基础上进行专科护理, 不仅可以降低术后并发症发病率, 还可以提高患者的满意度, 对于难治性水肿患者的

治疗具有重要的临床意义。

[参考文献]

- [1] 任海卫. 儿童肾病综合征难治性水肿行血液净化治疗的护理 [J]. 中国继续医学教育, 2016, 8(8):252-253.
- [2] 高军丽, 王蕾, 谢海燕. 血液净化治疗儿童肾病综合征难治性水肿行综合护理对患儿水肿情况、生活质量及家属满意程度的影响 [J]. 中国医药指南, 2017, 15(21):241-242.
- [3] 周洪文, 吴啟斌, 刘健君, 等. 两种血液净化方式治疗肾病综合征难治性水肿的疗效评价 [J]. 中国卫生标准管理, 2017, 8(25):48-50.
- [4] 吴泽成, 汤跃武, 李良志, 等. 血液净化治疗利尿剂抵抗肾病综合征水肿患者的疗效 [J]. 实用医学杂志, 2017, 33(3):402-404.
- [5] 黄志敏, 庞国珍. 托拉塞米与呋塞米治疗儿童肾病综合征伴高度水肿的疗效评价 [J]. 儿科药学杂志, 2017(5):12-14.