

护理干预对提升儿童疫苗接种配合度的效果分析

张春梅

白银市白银区王岷镇卫生院 甘肃白银 730900

〔摘要〕目的 探讨护理干预对提升儿童疫苗接种配合度的效果。方法 回顾分析 2018 年 1 月至 2018 年 12 月期间本院接收的 200 例儿童疫苗接种患儿，随机分为对照组与观察组各 100 例，对照组运用常规护理，观察组提供护理干预，分析不同执行后患者接种配合度、家长满意度情况。结果 在配合有效率上，观察组为 86%，对照组为 64%，两组数据对比有统计学意义 ($p < 0.05$)；在家长满意度上，观察组为 94%，对照组为 76%，两组数据对比有统计学意义 ($p < 0.05$)。结论 护理干预对提升儿童疫苗接种配合度以及提高患儿家属护理满意度有较好的支持作用，有效的优化护患关系，减少护理工作阻力。

〔关键词〕护理干预；儿童疫苗接种；配合度；效果

〔中图分类号〕R473.72 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165 (2019) 01-194-02

儿童疫苗接种也可以有效的减少传染病的发生，提升儿童健康状况，优化儿童免疫能力。但是由于儿童自身缺乏自控能力，在疫苗接种中表现出激烈的情绪表达，甚至由此影响家属的心理状态，对护理工作构成较大阻力。本文回顾分析 2018 年 1 月至 2018 年 12 月期间本院接收的 200 例儿童疫苗接种患儿，分析运用护理干预后患者接种配合度、家长满意度情况，内容如下：

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾分析 2018 年 1 月至 2018 年 12 月期间本院接收的 200 例儿童疫苗接种患儿，随机分为对照组与观察组各 100 例，对照组中男 53 例，女 47 例；年龄从 3 个月至 14 个月，平均 (5.28 ± 2.10) 个月；家属文化程度中，初中及以下为 23 例，高中为 39 例，大学及以上为 38 例；观察组中男 51 例，女 49 例；年龄从 3 个月至 12 个月，平均 (5.79 ± 1.54) 个月；家属文化程度中，初中及以下为 30 例，高中为 37 例，大学及以上为 33 例；两组患者在基本年龄、性别以及病情等信息没有明显差异，有可比性。

1.2 方法

对照组运用常规护理，观察组提供护理干预，具体内容如下：

1.2.1 接种前护理

接种前需要做好准备工作。接种前几天需要通知家长做好儿童的保暖工作，及时告知准备事项，回复家长提问，让家属避免让儿童感冒。做好儿童档案建立工作，做好疫苗接种基本健康宣教工作^[1]，让家长了解疫苗接种的优点，提升配合效果。让家长了解疫苗接种的禁忌问题，了解儿童过敏情况，尽可能的减少儿童接种疫苗期间的不良问题。健康教育工作方式可以多种多样，可以发放健康手册、提供健康教育微信推文等电子阅读材料，针对个体情况做一对一的沟通指导，以及开展健康讲座^[2]。具体方式依据各地区情况而定，保证处理应对的匹配性。尤其是当下年轻家长电子阅读习惯

养成，可以编写电子微信推文来做好指导工作，避免家长接触网络上谣言，纠正不良认知。

1.2.2 接种中护理

要做好接种环境管理，保持温馨氛围，减少患儿心理上的不适感。可以张贴卡通动漫墙面贴纸，甚至提供玩偶像像，提升儿童对环境的喜爱程度，达到注意力转移的作用^[3]。要做好患儿心理状况的观察，多鼓励表扬儿童，做好儿童肌肉情况的观察。要做好肢体固定的引导，提升家属对工作的配合度。做好必要沟通，疏解儿童的紧张情绪。如果有哭闹情绪，需要做好对应的安抚，甚至让家属用随身携带的玩具来安抚患儿，或者通过播放动画片来转移注意力。

1.2.3 接种后护理

在接种后需要观察儿童情况，保持半小时的观察期，而后让家属带儿童离开。如果有不良反应情况出现，需要提供对应干预措施。要嘱咐家属必要当天给患儿做洗澡等处理，同时安抚患儿做好充分睡眠的保证，让患儿多饮水，避免距离而活动，禁止患儿对注射部位的抓挠，防控感染。

1.3 评估观察

分析不同执行后患者接种配合度、家长满意度情况。接种配合度分为完全配合、基本配合与不配合，总配合率为完全配合率和基本配合率的总和。家长满意度分为非常满意、基本满意、不满意，总满意率为非常满意率和基本满意率的总和。

1.4 统计学分析

将护理所得数据通过 spss17.0 分析，计量资料运用 t 检验，计数资料使用卡方检验， $p < 0.05$ 有统计学意义。

2 结果

2.1 患方接种配合度情况

见表 1，在配合有效率上，观察组为 86%，对照组为 64%，两组数据对比有统计学意义 ($p < 0.05$)；

表 1：患方接种配合度情况 [n(%)]

分组	n	完成配合	基本配合	不配合	总配合率
观察组	100	68 (68.00)	18 (18.00)	14 (14.00)	86%
对照组	100	35 (35.00)	29 (29.00)	36 (36.00)	64%

注：两组对比， $p < 0.05$

作者简介：张春梅 (1980—)，女，汉族，专科，护师，甘肃白银市人，主要从事免疫规划工作。

采用 SPSS17.0 软件进行统计学分析, 计量资料采用 ($\bar{x} \pm s$) 表示, 行 t 检验。计数资料采用 (%) 表示, 行 χ^2 检验, $P < 0.05$ 有统计学意义。

2 结果

观察组护理满意率为 100.0% (30/30), 对照组为 83.3% (25/30), 差异显著 ($P < 0.05$), 对比 NIHSS 评分以及 Barthel 评分结果, 均提示观察组所得结果更佳 ($P < 0.05$), 见表 1。

表 1: 两组治疗后 NIHSS 评分及 Barthel 评分的比较

组别	例数	NIHSS 评分	Barthel 评分
对照组	30	47.1 $\pm$ 5.4	52.5 $\pm$ 2.8
观察组	30	28.3 $\pm$ 3.6	66.3 $\pm$ 4.1
t	—	15.866	15.224
P	—	0.000	0.000

3 讨论

脑出血患病率较高, 发病突然且病情进展极快, 临床具有较高的致死率及致残率, 对患者生命安全以及日常生活质量均会带来严重影响。脑出血高发于中老年人, 近年来我国该疾病患病率有明显上升。老年重症脑出血的病情重, 临床治疗难度大, 康复周期长。患者在接受治疗过程中极易出现负面情绪, 影响患者治疗配合度。优质护理干预是一种新型

护理理念, 其遵循以人为本护理理念, 在临床护理服务中依据不同患者病情、需求的不同实施针对性护理服务, 在满足临床治疗需求的同时兼顾患者自身心理以及生理需求, 帮助患者提高治疗期间的舒适度, 促使其可积极配合护理工作, 提高护理服务质量^[3]。在本次研究中观察组增加实施了并发症护理、健康教育、心理干预等优质干预服务, 结果显示观察组神经功能缺损评分明显低于对照组, Barthel 评分的比较结果则提示观察组更高。证明优质护理服务的应用更利于患者康复, 对比两组护理满意率结果显示观察组患者对护理服务的满意度更高, 证明优质护理服务的应用患者更为认可, 这对促进护患关系和谐发展也具有积极影响。

综上所述, 优质护理干预的应用可提高老年重症脑出血的治疗效果, 改善患者脑神经功能以及患者的日常生活能力、提高护理满意度, 临床应用价值较高。

[参考资料]

- [1] 宋洁茹. 优质护理对老年重症脑出血患者疗效及满意度的影响 [J]. 包头医学院学报, 2017, 33(4):103-104.
- [2] 刘洁, 连平. 优质护理干预在老年重症脑出血患者中的应用 [J]. 齐鲁护理杂志, 2017, 23(17):90-91.
- [3] 徐慧红, 俞洪波. 优质护理干预对重症脑出血患者神经功能监测与评估、并发症及护理满意度的影响 [J]. 中国医学创新, 2017, 14(30):72-75.

(上接第 194 页)

2.2 患儿家长满意度情况

见表 2, 在家长满意度上, 观察组为 94%, 对照组为 76%, 两组数据对比有统计学意义 ($p < 0.05$)。

表 2: 患儿家长满意度情况 [n(%)]

分组	n	非常满意	基本满意	不满意	满意率
观察组	100	74 (74.00)	20 (20.00)	6 (6.00)	94%
对照组	100	51 (51.00)	25 (25.00)	24 (24.00)	76%

注: 两组对比, $p < 0.05$

3 讨论

儿童疫苗接种工作会因为儿童自身缺乏自控能力而导致注射工作存在阻力, 加大的工作压力, 甚至容易引发护患矛盾冲突。要做好有关指导工作来提升家长的配合, 避免不良配合导致儿童接种后出现不良反应。具体工作处理中, 需要考虑到儿童与家长的个体情况差异, 保证处理应对的匹配度, 由此来更好的优化工作水准。要充分的利用接种前的指导、

接种中的操作以及接种后的随访工作来做好教育指导, 让家长更好的规避不良照料行为, 减少接种工作风险, 让儿童对接种工作保持积极配合, 避免内心过度排斥感, 要积极的做好儿童心理状态建设, 提升接种工作的配合度。

综上所述, 护理干预对提升儿童疫苗接种配合度以及提高患儿家属护理满意度有较好的支持作用, 有效的优化护患关系, 减少护理工作阻力。

[参考文献]

- [1] 刘淑丽. 精细化护理干预对儿童预防接种效果的影响 [J]. 智慧健康, 2018, 4(36):22-23.
- [2] 王艳梅. 分析全程护理干预对儿童疫苗接种配合度及家长满意度的影响 [J]. 家庭医药, 2017, (10):210.
- [3] 丘银霞, 丘燕玲. 系统化护理干预在白百破疫苗接种中的应用 [J]. 齐鲁护理杂志, 2018, 24(21):84-86.
- [4] 王艳梅. 全程护理干预对儿童疫苗接种配合度及家长满意度的影响 [J]. 养生保健指南, 2017, (3):86.

(上接第 195 页)

很多, 严重时候还会抽搐, 甚至昏迷。严重的威胁着产妇以及新生儿的生命安全^[3]。本文的研究当中, 对于产妇进行优质产前护理干预, 通过对产妇的心理进行调节和调整, 能够有效的改善产妇的心理状态, 避免产妇产生消极的心理, 从而降低产妇的抑郁情绪和焦虑情绪^[4], 并且能够在很大程度上保证新生儿的质量, 减少新生儿的不良反应发生概率, 提升新生儿的成活率^[5], 因此, 产前优质护理, 对妊娠高血压产妇负性情绪的改善作用效果显著, 分娩结局的影响通常是优良的, 因此, 产前优质护理适合在临床进行大面积的推广和使用。

[参考文献]

- [1] 谢文敏. 以信息化为基础的优质护理服务在妊娠高血压综合征产妇产后出血护理中的应用效果分析 [J]. 中外医疗, 2018, 37(30):140-142.
- [2] 闫怀蕊, 张秀, 赵晓彤, 罗云. 优质护理在妊娠高血压综合征产妇产后出血中的应用 [J]. 齐鲁护理杂志, 2018, 24(23):50-52.
- [3] 臧银平. 研究细致化护理在提升妊娠高血压疾病产妇产前分娩自我效能中的效果 [J]. 罕少疾病杂志, 2018, 25(06):34-36.
- [4] 范银叶. 人性化护理干预对妊娠高血压综合征产妇产后出血的影响 [J]. 首都食品与医药, 2018, 25(22):80-81.
- [5] 鄢爱英. 整体护理对妊娠高血压产妇产程的影响 [J]. 当代护士 (上旬刊), 2018, 25(12):89-91.