

儿科护理安全隐患相关因素分析以及防范对策

张 莉

西平县中医院 河南驻马店 463900

〔摘 要〕目的 分析并总结儿科护理中的安全隐患相关因素以及防范对策。方法 选取 2017 年 4 月至 2018 年 4 月在本院接受治疗的 180 例患儿作为临床研究对象,并随机将这 180 例患儿随机分为对照组和观察组,每组患儿的数量均为 90 例,对照组患儿采用常规的护理措施,观察组患儿则采用优质的综合性护理措施,观察并记录两组患儿在住院治疗期间对护理的满意程度以及意外情况的发生率。结果 观察组患儿在实行优质的综合性护理措施后,家长对护理工作的满意程度以及意外情况的发生率均优于对照组的常规护理措施,且护理效果有明显的变化 ($P<0.05$),差异具有统计学意义。结论 在儿科医学临床中应用优质的综合性护理措施能够有效的减少意外情况的发生频率,同时还能有效的提升护理满意度,这种优质的综合性合理措施值得在医学临床中推广和应用。

〔关键词〕儿科护理;安全隐患;相关因素;防范对策

〔中图分类号〕R473.72 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165 (2019) 02-172-02

0 引言

在经济发展的背景下,我国的医疗事业也进行了不断的完善和改革,与此同时人们对儿科护理也有了更高的要求。儿科科室是医院科室中的重要组成,由于患儿的年龄比较小,再加上疾病的发展速度比较快,家长对孩子的病情较为关注,在情绪或者行为上会出现一些偏激,从而就导致儿科科室上升为一个高风险的科室。在这样的背景下,儿科护理安全隐患问题引起了广大家长以及医护人员的关注和重视。护理安全主要就是指在对患儿进行护理的过程中确保患儿的身心健康,而不会出现一些危害患儿心理或者身体的情况。此次研究主要就是选取在本院接受治疗的 180 例患儿为研究对象,对护理安全隐患因素进行分析并提出防范对策,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2017 年 4 月至 2018 年 4 月在本院接受治疗的 180 例患儿作为临床研究对象,采用随机分组的方式将这 180 例患儿分为每组各 90 例的对照组和观察组,其中对照组中男性患儿的数量为 53 例,女性患儿的数量为 37 例,年龄阶段为 1-6 岁,平均年龄为 (3.6 ± 1.6) 岁;观察组中男性患儿的数量为 50 例,女性患儿的数量为 40 例,年龄阶段为 1-7 岁,平均年龄为 (5.2 ± 1.3) 岁,这两组患儿在性别以及年龄等方面没有明显的差异 ($P>0.05$),可以作为临床对象,具有可比性。

1.2 治疗方法

对照组的 90 例患儿实行常规的护理措施,观察组的 90 例患儿则实行优质的综合性护理措施,对比两组患儿的护理满意度以及意外情况发生率,并进行记录和分析。

1.3 护理方法

1.3.1 对照组

对照组的患儿在住院期间采用常规的儿科护理措施,并对患儿的生命体征以及变化情况进行记录。

1.3.2 观察组

观察组的患儿采用优质的综合性护理措施,并对安全隐患的相关因素采取一定的防范措施,根据可能会出现的安全隐患,具体防范内容如下: (1) 加强对护理工作人员的理论

知识和技能方面的培训,并对相关的法律知识也进行一定的了解和掌握,建立完善的护理管理机制,并定期对护理工作人员的工作进行考核。(2) 提升护理工作人员的整体素质,让护理人员掌握良好的沟通技巧和护理能力,要重视对患儿护理的细节,尽可能的减少意外情况的发生。(3) 合理的安排儿科的护理工作人员,根据患儿的实际病情以及需求配备高素质的护理人员,能够有效的降低护理工作的强度,并降低意外情况的发生频率。(4) 护理工作人员在对患儿进行用药时要严格按照医嘱使用药物,并掌握药物的用量以及药物的后期反应及副作用。(5) 加强对患儿病情的观察、巡视和护理,并对家长进行相关的健康教育宣传,让家长掌握相关疾病的简单护理及注意事项。(6) 完善护理工作的评价机制,以便针对存在的问题进行有效的处理,并不断的增强护理人员的法律意识。

1.4 观察指标

对两组患儿家长对护理满意度以及意外情况的发生率进行观察和记录,为开展临床护理工作提供重要的基础数据和信息。

1.5 统计学方法

使用统计学软件 SPSS19.0 进行数据的统计学分析。

2 结果

通过对两组患儿实行不同的护理措施,对护理满意度以及意外情况的发生率进行了有效的调研,结果显示观察组患儿的护理满意度和意外情况的发生率均优于对照组患儿,统计存在明显差异 ($P<0.05$)。详情见表 1。

表 1: 两组患儿护理满意度与意外情况发生率对比 (n, %)

组别	n	护理满意度 (n, %)	意外情况发生率 (n, %)
对照组	90	(74, 85.67%)	(3, 15.6%)
观察组	90	(89, 96.67%)	(13, 3.33%)

注: 与对照组比较, $P<0.05$

3 讨论

近年来,随着经济的不断发展,医疗行业的竞争也越来越激烈,人们对医院的护理质量也有了更高的要求。调查显

(下转第 175 页)

2.2 对比并发症情况

A 组的并发症发生率为 9.68%，B 组为 30.77% ($P <$

0.05)，详见表 2。

表 2：对比并发症情况 [n (%)]

分组	例数	咽喉干痒	肺炎	感染	发生率
A 组	31	2 (6.45)	1 (3.23)	0	9.68 (3/31)
B 组	26	4 (15.38)	3 (11.54)	1 (3.85)	30.77 (8/26)
χ^2	—	—	—	—	4.039
P	—	—	—	—	0.045

3 讨论

糖皮质激素 (ICS) 与 β_2 受体激动剂 (LABA) 是 AECOPD 患者雾化吸入的常用药，能够增强呼吸道黏膜的清除能力，消除呼吸困难等症状，缓解呼吸肌的疲劳感^[2]。其雾化吸入效果较佳，但需要结合护理干预，以确保治疗安全。临床路径护理针对该病患者的以往治疗经验制定出全面的护理措施，通过操作护理可提高雾化吸入治疗的科学性，促进患者排出痰液^[3]。管道护理可保证雾化器的清洁度，避免因管道因素导致上呼吸道感染，可避免医源性不良事件。药物护理可提高用药合理性，针对患者情况给予个体化治疗，具有人文性特征。健康教育可消除患者的不良心理，提高其疾病认知度。以上护理措施利用患者的治疗依从性提升^[4]。结果为：A 组的血气分析与肺功能指标均优于 B 组 ($P < 0.05$)；并发症发

生率 (9.68%) 低于 B 组 (30.77%) ($P < 0.05$)。可见，临床路径护理可改善该病患者的肺功能指标，确保其治疗安全，应用效果较佳。

[参考文献]

- [1] 程晶晶. COPD 急性期患者呼吸道雾化吸入临床路径护理体会 [J]. 母婴世界, 2015, 4(14):277-277, 278.
- [2] 王莉. COPD 急性期患者呼吸道雾化吸入的临床护理观察 [J]. 中国医药指南, 2014, 7(33):329-330.
- [3] 张昭, 张婷婷, 彭瑞敏, 等. 不同雾化吸入方式对慢性阻塞性肺疾病急性期的临床疗效 [J]. 中华肺部疾病杂志 (电子版), 2015, 8(4):55-56.
- [4] 任志红, 高颖. 雾化辅助治疗 COPD 急性发作期患者的护理体会 [J]. 大家健康 (下旬版), 2016, 10(1):218-219.

(上接第 172 页)

示在儿科护理工作中医护纠纷事件越来越多，其中患儿坠床摔伤等情况屡见不鲜，产生这一现象的主要因素就是护理工作不到位。儿科的患儿本就比较特殊，就决定了儿科科室注定具有高风险性，因此分析儿科患儿在护理中存在的安全隐患因素并采取有效的防范措施是十分有必要的。目前优质综合性合理措施已经在儿科护理中得到了广泛的普及和应用，本次调查证明，观察组 90 例患儿实行优质综合性的护理措施较对照组实行的常规护理措施相比，其护理满意程度以及意外情况的发生率都明显的优于对照组，优质综合性的护理措施能够根据护理工作中可能会出现的安全隐患因素进行分析，并且能够提出有效的防范措施，能够有效的避免和降低意外情况的发生频率。

综上所述，儿科患儿具有一定的特殊性，在其住院治疗

期间实行优质综合性的护理措施，不仅能够降低意外情况的发生频率，还能有效的提升家长对护理工作的满意程度，优质综合性护理措施值得在进行临床推广。

[参考文献]

- [1] 曾芬, 冯皓, 于淑芹, 尚黎, 白凤芝. 儿科护理管理中存在的安全隐患分析及防范对策 [J]. 河北医药护理学杂志, 2015, 35(12): 1915-1916.
- [2] 李中伟, 石燕, 程云芳, 宋焕玲, 唐婷婷. 儿科护理安全隐患相关因素分析及防范对策 [J]. 检验医学与临床, 2017, 05(14): 190-191.
- [3] 刘颖, 薛秀丽, 胡亚妮, 陈淑云, 等. 儿科护理安全隐患相关因素分析及防范对策 [J]. 中国实用护理杂志, 2014, 15(32): 162-163.

(上接第 173 页)

度显著高于对照组，比较差异具有显著性 ($P < 0.05$)。如下表

表 2：两组患者术后疼痛程度和护理满意度比较

组别	术后疼痛评分 (分)	护理满意度 [n (%)]
观察组 (n=30)	2.88±1.37*	28 (93.33) *
对照组 (n=30)	5.20±2.10	24 (80.00)

注：与对照组对比，* $P < 0.05$ 。

3 讨论

优质护理是当前临床大力普及的一种护理模式，其护理措施实施的核心在于“实现护理服务的优质化”，从护理方案的制定到最终的护理实施，始终围绕着这一核心理念进行^[4]。其最大的优势在于，护理实施过程中不仅兼顾了患者的个体化差异，同时也注重护理干预实施的全面性，以此来达到改善患者临床疗效的目的^[5]。本次研究中，对行腹腔镜手术治疗后的胆囊结石患者实施优质护理，获得了显著成效。

综上所述，对腹腔镜手术治疗的胆囊结石患者，在术后配合优质护理干预，能够显著缩短患者术后康复时间，有效缓解患者术后疼痛程度，从而提高患者护理满意度。

[参考文献]

- [1] 陆宏霞, 班彩琴. 腹腔镜胆囊切除术的围手术期优质护理在老年胆结石患者中的应用 [J]. 牡丹江医学院学报, 2017, 38(03): 151-152.
- [2] 陆树玲, 李晓芹, 尚乃霞. 腹腔镜治疗高龄胆结石患者的围手术期护理体会 [J]. 中外医学研究, 2018(03): 110-111.
- [3] 刘培会. 老年急性结石性胆囊炎患者围手术期实施优质护理的效果观察 [J]. 中国社区医师, 2017, 33(05): 113-114.
- [4] 汤雪丽. 优质护理用于胆囊结石腹腔镜术后患者的效果观察 [J]. 中外女性健康研究, 2016(24): 105.
- [5] 张乃霞. 优质护理用于胆囊结石腹腔镜术后患者的效果观察 [J]. 实用临床护理学电子杂志, 2016, 1(07): 58.