

急诊危重症患者进行整体性急诊急救护理的临床应用价值研究

何小曼

浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区 310016

【摘要】目的 探讨急诊危重症患者进行整体性急诊急救护理的临床应用价值。**方法** 以我院 100 例危重患者为研究对象,随机分为研究组(50 例)和对照组(50 例)。对照组给予常规急救,研究组给予整体急救。比较两组抢救成功率和护理满意度。**结果** 研究组和对照组抢救成功率分别为 96.00% 和 84.00% ($P<0.05$), 护理总满意率分别为 94.00% 和 78.00% ($P<0.05$)。研究组抢救成功率和总满意率均高于对照组。**结论** 整体急诊护理在危重病人抢救中的应用,能有效提高护理工作的效率和满意度,具有良好的临床应用价值。

【关键词】 整体性;危重症患者;抢救成功率;护理满意度;应用价值

【中图分类号】 R47

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2019) 07-172-02

急诊科室属于医院中较为特殊的一个科室,主要救治是各种危重症患者^[1]。该科室收治的患者病情较危急且严重,救护不得当或者不及时都有可能威胁患者的生命安全,护理人员在此过程出现任何纰漏,都有可能对患者的病情造成不可逆的影响。因而如何采取有效的护理措施提高抢救成功的概率成为临床护理关注的重点。为了进一步研究整体性急诊急救护理对急诊危重症患者的应用价值,提高急诊急救的护理效果,本研究从我院收治的急诊危重症患者中选取 100 例分为两组进行研究,对其采用不同的急诊急救护理方式,通过观察得出如下结果。

1 资料与方法

1.1 临床资料

从 2017 年 10 月~2018 年 10 月我院收治的急诊危重症患者中抽选 100 例进行研究,随机分为研究组和对照组,每组 50 例。研究组中有男 28 例,女 22 例;年龄为 19~82 岁,平均年龄为 (53.17 ± 5.87) 岁;其中心血管疾病有 12 例,脑血管疾病有 9 例,呼吸系统疾病有 21 例,其他疾病有 8 例。对照组中有男 26 例,女 24 例;年龄为 18~80 岁,平均年龄为 (54.28 ± 5.64) 岁;其中心血管疾病有 14 例,脑血管疾病有 7 例,呼吸系统疾病有 23 例,其他疾病有 6 例。经统计,两组患者的性别、年龄以及疾病类型等一般资料的差异无统计学意义 ($P>0.05$),具有可比性。

1.2 护理方案

对照组患者给予常规急诊急救护理:患者入院后,迅速根据患者的实际情况为其进行分诊,严密关注患者的病情变化,协助医生为患者进行体征监测、人工吸氧、抽血送检等救治护理,以及急救后将患者转到专科病房进行后续治疗。研究组患者则给予整体性急诊急救护理,具体操作方法为:(1)院前的急救护理。入院前,护理人员需要依据患者的具体病况实行恰当的急救护理措施。如遇到患者需要现场急救的情况,需时刻与现场人员保持联系,以便及时了解患者的病况和现场的急救情况。在急救车将患者送往医院的途中,护理人员应该向车上的救护人员了解患者的一般资料,如年龄、性别、病况等,同时结合患者的实际状况做好急救的准备工作。(2)分诊工作。患者入院后,护理人员要根据患者的病况为其安排合适的急救床,同时备好相应的急救药品和物品,然后由较有经验的护理人员对患者进行急诊分诊,并根据分诊结果做好相关的急救准备工作。(3)急救护理。在实施急救的过

程中,应优先处理呼吸骤停、休克大出血等病情危急的患者。护理人员应为患者吸氧,确保其处于呼吸畅通的状态,并为其建立静脉通道。对患者的生命体征及病情发展进行实时监测,若出现异常则需立即告知主治医生,并配合医生进行急救。为防止院内的交叉感染,需要保证急救过程符合无菌操作的要求。(4)全程陪同护理。护理人员需要陪同患者完成全部检查项目,检查前可先与检查科室确定合适的检查时间,再陪同患者前往检查。在急救过程中需要及时准备必要的抢救物品和药品,保证急救工作的顺畅进行。将患者送至专科病房之后,需要与病房相应的护理人员做好各项工作的交接。

1.3 观察指标

观察两组患者的抢救成功率和护理满意度。护理满意度采用本院的满意度调查表进行统计,分为十分满意、满意和不满意 3 个等级,满意度评分总分为 100 分,80 分~100 分为十分满意,60 分~80 分为满意, <60 分则为不满意。总满意率 = (十分满意例数 + 满意例数) / 总例数 $\times 100\%$ 。

1.4 统计处理方法

统计数据均采用 SPSS20.0 软件进行处理,计量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示,进行 t 检验;计数资料以率 (%) 表示,进行卡方 χ^2 检验。 $P<0.05$ 具有统计学意义。

2 结果

研究组和对照组的抢救成功率分别为 96.00% 和 84.00% ($P<0.05$), 护理总满意率分别为 94.00% 和 78.00% ($P<0.05$), 研究组的抢救成功率和总满意率均高于对照组。

3 讨论

急诊急救工作在临床诊治上对患者生命安全有着最直接、最关键的影响,左右着患者的生命安危。医护人员在急救的过程中必须争分夺秒,为患者实行最及时、最恰当的救护措施,确保患者在最好的抢救时机内获得最佳的抢救效果。在这个过程中,护理人员任意一项护理措施实施不当都会延误急救时间,最终影响到急救效果。因此,采取科学有效的护理方式对急诊危重症患者进行抢救具有十分重要的意义。整体性急诊急救护理是一种贯穿于整个急诊急救过程的先进护理模式。在对急诊危重症患者进行抢救的过程中,入院前护理人员需要根据患者的病况进行恰当的护理干预;入院时需要为患者安排急救床,准备好各种急救物品和药品并仔细做好分诊工作;急救时要时刻关注患者的生命体征和病情变化并做

(下转第 174 页)

表 2: 两组患者护理满意度对比 [n, %]

组别	n	非常满意	满意	一般满意	不满意	总满意度
观察组	40	11	21	6	2	95.0
对照组	40	8	11	8	13	67.5
χ^2						6.847
P						< 0.05

3 讨论

急性胸痛则是急诊科常见疾病, 由于发病突然, 病情恶化快, 所以临床抢救尤为必要。相关研究^[2]指出, 通过加强急性胸痛患者急诊护理干预, 制定针对性护理措施, 以此来确保患者生命健康。本研究基于急性胸痛患者患者可能会出现护理风险, 制定了针对性护理措施(心理护理、病情观察、对因处理、吸氧护理、输液护理), 研究结果表明观察组 VAS 评分明显低于对照组, 且护理满意度更高 ($P < 0.05$), 这一结论同方海鹰, 王丽彦等研究^[3]结果相一致, 充分证实了

(上接第 170 页)

老年慢阻肺是一种常见病, 治疗过程漫长, 若得不到有效控制, 会直接危及患者生命安全。多数老年人身体素质差、精神素质差, 在治疗过程中, 病情往往得不到有效控制, 加之经济压力等, 老年人在治疗过程中常出现焦虑、抑郁等情绪, 对治疗依从性、治疗效果均产生一定影响。所以在治疗老年慢阻肺病症的过程中, 需要对患者进行行之有效的心理干预措施, 以不断提升老年慢阻肺患者生活质量以及肺部功能^[5]。

心理干预能够有效应对老年人可能出现的心理健康问题, 同时通过密切的沟通交流, 护理工作人员可全面了解患者病症发展情况, 同时拉近医患距离。在本次研究中, 应用心理干预的观察组, 患者满意度明显优于对照组, 且负面情绪程度低于对照组, 证明心理干预应用效果显著, 该方法值得

(上接第 171 页)

调, 导致阳盛不入阴, 阴虚不纳阳, 心神不安, 心失所养而不寐, 治疗时主要以调和阴阳为主, 驱邪扶正气, 使患者恢复至阴平阳秘状态^[3-4]。本研究患者主要借助针灸护理进行干预, 结果显示, 观察组患者治疗后睡眠质量明显提高。提示, 针灸护理干预在失眠症患者护理中应用的效果较好, 通过针刺神门穴、安眠穴及三阴交等穴位可使静脉气血流畅达到缓解症状的效果, 是治疗失眠症有效的辅助手段。

综上所述, 失眠症患者护理中应用针灸护理的效果显著, 可提高患者睡眠质量, 具有临床推广应用价值。

(上接第 172 页)

好应对措施; 需要陪同患者进行各项检查, 实现全程陪护。整体性急诊急救护理的实施有利于促进急诊急救工作流程的标准化和规范化, 有效减少急救过程中的失误, 进而确保急救工作的顺利开展。本研究结果显示, 研究组患者的抢救成功率达到 96.00%, 高于对照组的 84.00% ($P < 0.05$), 说明对急诊危重症患者采用整体性急诊急救护理能达到更优的急救效果; 研究组患者的护理总满意率达到 94.00%, 明显高于对照组的 78.00% ($P < 0.05$), 说明整体性急诊急救护理能有效提升患者的护理满意度。

综上所述, 在急诊危重症患者的急救中, 采用整体性急诊急救护理不仅能提高护理的有效率, 还能有效提升患者对护理

对于急性胸痛患者实施急诊护理干预的必要性, 值得我们学习与借鉴。值得注意的是, 各级医院应高度重视护理人员急诊护理教育培训, 强化护理人员风险意识, 引导其在护理工作中始终保持较高的警惕性, 积极应对急诊疾病的抢救。护理人员应站在患者的角度进行思考, 尊重与体谅患者, 积极主动地同患者进行交流沟通, 对患者的实际情况予以充分了解, 强化学科知识、操作技能, 从而为患者提供更细致、更优质的护理服务。

参考文献:

- [1] 聂桂萍, 王立志, 王立海. 急性胸痛患者急诊室护理措施应用效果分析 [J]. 中国医学创新, 2016, 13(28):92-94.
- [2] 郑娜. 急性胸痛患者应用急诊护理途径的效果研究 [J]. 安徽卫生职业技术学院学报, 2017, 16(5):109-110.
- [3] 方海鹰, 王丽彦, 金珊. 急性胸痛患者实施急诊护理途径的效果分析 [J]. 中外女性健康研究, 2018(7):128-129.

在各大医院推广。

参考文献:

- [1] 顾赛蕾. 老年慢阻肺患者实施心理护理干预的临床研究 [J]. 饮食保健, 2019, 6(31):249.
- [2] 莫洪琴. 心理护理在老年慢阻肺患者护理中的应用价值体会 [J]. 养生保健指南, 2019(43):188.
- [3] 张学霞. 老年慢阻肺患者心理特点与护理干预的效果分析 [J]. 养生保健指南, 2019(16):34.
- [4] 曹小霞. 分析临床护理干预在老年慢阻肺护理工作中的应用效果及对患者生存质量的影响 [J]. 养生保健指南, 2019(35):44.
- [5] 陈娟. 应用心理护理对提高老年慢阻肺患者生活质量的干预效果 [J]. 健康必读, 2019(13):210.

参考文献:

- [1] 申瑜. 中医护理干预对老年失眠患者的疗效观察 [J]. 中外女性健康研究, 2015, 11(22):120.
- [2] 张清华. 针灸结合护理干预治疗失眠症的疗效观察 [J]. 光明中医, 2016, 31(9):1334-1335.
- [3] 蔡晓敏, 章旭萍, 唐杏, 等. 耳穴贴压结合音乐疗法对脑卒中后失眠的疗效观察 [J]. 针灸推拿医学 (英文版), 2015, 8(4):227-231.
- [4] 黄梦昕. 睡眠障碍患者的护理 [J]. 现代养生 B, 2014, 16(5):183-183.

工作的满意程度, 是一种具有较高临床应用价值的护理方案。

参考文献:

- [1] 王蕊. 对急诊危重症患者进行整体性急诊急救护理的效果探析 [J]. 临床医药文献电子杂志. 2017(21)
- [2] 闫敏. 急诊危重症患者应用整体性急诊急救护理的效果探析 [J]. 基层医学论坛. 2018(08)
- [3] 王琳. 标准化急救护理在急诊危重症患者抢救中的应用探讨 [J]. 中国继续医学教育. 2016(29)
- [4] 李爱春. 护理风险管理在呼吸科危重症患者中的应用效果 [J]. 河南医学研究. 2017(15)
- [5] 杨青春, 张秀兰, 刘玲. 危重症患者长途转运中沟通协调问题的探讨 [J]. 中国卫生产业. 2018(33)