

护理标识在泌尿外科护理安全管理中的应用

饶丽文

容县人民医院 广西容县 537500

【摘要】目的 分析护理标识应用于泌尿外科的护理安全管理中的效果。**方法** 以我院泌尿科2019年1月~12月收治的66例患者作为对象进行研究,以随机分组法分别纳入观察组与对照组,每组33例,对照组的护理方案为常规的泌尿外科护理流程和内容,观察组在此基础上实施了护理标识方案,观察两组的临床护理效果。**结果** 观察组的就医依从性、临床安全感以及生活质量的评分都明显高于对照组,而观察组的临床不良事件发生率3.03%且显著低于对照组21.21%,组间差异都具有统计学意义($P < 0.05$)。**结论** 泌尿外科的护理安全管理中应用护理标识能够提高临床护理效果,降低不良事件的发生率,促进护患关系的和谐,值得临床应用。

【关键词】 护理标识; 泌尿外科; 护理安全**【中图分类号】** R473.6**【文献标识码】** A**【文章编号】** 2095-9753 (2020) 02-116-02

护理标识是以提高医院医护质量与患者的安全为根本目标而采用的一系列具有警示或提醒作用的图案、文字、防护用品等,能够对患者和家属、医护人员的行为、操作起到指导作用,有效降低临床安全事故的发生,促进医患关系的和谐。在泌尿外科的护理安全管理中使用护理标识,能够促进护理人员工作的有效实施,减少和杜绝不良护理事件的发生,对患者的身体恢复健康具有积极影响^[1]。基于此,本研究将对护理标识应用于泌尿外科的护理安全管理中的效果进行分析和讨论。

1 资料与方法

1.1 一般资料

所选的研究对象都为我院泌尿科2019年1月~12月收治,符合本次研究标准的共66例,主要为肾结石、前列腺发炎或增生、输尿管结石等疾病患者,以随机分组法分别纳入观察组与对照组,每组33例。对照组中有男性21例、女性12例,年龄21~73岁,平均 (45.79 ± 11.02) 岁,病程0.6~6年,平均 (2.24 ± 0.74) 年;观察组中有男性22例、女性11例,年龄19~72岁,平均 (46.01 ± 11.48) 岁,病程0.5~6年,平均 (2.16 ± 0.85) 年。两组的一般资料不存在显著差异($P > 0.05$),可比性充分。

1.2 方法

对照组的护理方案为常规的泌尿外科护理流程和内容,主要是监测患者的血压、体温、呼吸状况等,定期进行病情观察和引流管护理操作、冲洗膀胱,必要时向患者及家属提供饮食建议,针对患者的一些不良事件做应激处理等。

观察组在对照组基础上实施了护理标识方案,增强了护理安全管理工作:(1)对不同级别的物体进行标识,比如,根据患者的病情、是否存在药物过敏以及其他物品过敏情况设定相应的标识,病情严重者使用红色手腕或衣服标识,对某种药物过敏时也使用红色标识,而普通病情以及不存在过敏情况的则使用黄色、绿色、蓝色等颜色进行标识^[2]。(2)对危险的区域、行为、物品进行标识,如在床边标识“避免坠床”,对于暂时不能下床活动的患者标识“禁止下床活动”,厕所区域标识“注意防滑、防跌”等;同时,将已经消毒和灭菌的医用物品做好安全标识,并严格与未消毒或未灭菌的物品分离开。(3)做好药物标识,对不同患者的药物做好标识,包括使用方法以及时间、患者的名字、疾病类型等,对

于需要进行配制的药物,需要做好配制时间、使用时间等标识,防止出现错误的用药事件。(4)做好导管、用氧安全标识,将导管的安全系数做好明确的标识,注明导管的大小、型号、置管时间等,并为导管接头设置明显的安全标识。比如,对于存在危险的导管使用红色或黄色的标识;氧气瓶中存储的氧气量、使用时间等标识清楚。

1.3 观察指标

评估患者住院治疗过程中的依从性、安全感以及生活质量,均采用视觉模糊评分法,满分100分,得分越高说明其安全感、生活质量、依从性也越良好。同时,记录患者住院治疗期间出现的跌倒、出血、坠床、非计划性脱管等不良护理事件的发生次数,并计算出发生率进行比较。

1.4 统计学处理

将研究所得的相关数据先经Excel处理,然后使用SPSS23.0软件进行统计学分析,计量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示,计数资料以(%)表示,并对计量资料和计数资料进行t、 χ^2 值检验,同时经P值检验后以 $P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的就医依从性、临床安全感以及生活质量的比较

观察组的就医依从性、临床安全感以及生活质量的评分都明显高于对照组,且组间差异具有统计学意义($P < 0.05$)。见表1。

表1: 两组患者的就医依从性、临床安全感以及生活质量的比较 ($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	就医依从性	临床安全感	生活质量
观察组	33	95.16 ± 4.03	93.47 ± 6.35	91.65 ± 5.23
对照组	33	85.37 ± 6.15	84.09 ± 6.69	82.96 ± 6.52
t		12.697	10.365	9.965
P		< 0.05	< 0.05	< 0.05

2.2 两组不良护理事件发生率比较

观察组的临床不良事件发生率3.03%显著低于对照组21.21%,组间差异具有统计学意义($P < 0.05$)。见表2。

3 讨论

泌尿外科是医院的一个重要科室,由于其疾病类型多,如肾结石、输尿管结石、前列腺发炎等都是非常常见的疾病类型,且发病率也较高,这给临床护理工作带来较大的压力。

表 2: 两组不良护理事件发生率比较 [n (%)]

组别	例数	出血	跌倒	坠床	非计划性托管	总发生率
观察组	33	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.03)	1 (3.03)
对照组	33	1 (3.03)	1 (3.03)	2 (6.06)	3 (9.09)	7 (21.21)
χ^2						6.984
P						< 0.05

而临床护理工作的质量又直接关系到患者的身体康复速度以及相关不良事件的发生率,所以临床上对护理工作的质量要求也越来越高^[3]。近年来,临床上针对泌尿科疾病的治疗措施在不断创新,临床疗效也越来越显著,但是,一些临床并发症以及风险事件仍然无法避免,尤其是一些病情比较复杂和严重的患者,出现医疗风险事故的概率也较大^[4]。因此,泌尿外科的临床治疗中需要通过高质量的护理服务来降低不良事件的发生率,提高医疗安全。

当前,泌尿外科常见的安全事件有坠床、出血、导管脱落、跌倒、用错药物等,临床上针对此类不良事件采取护理标识方式进行预防,使得相关的危险事件和不良操作能够一目了然,护理工作也得以有序地开展,提高临床护理质量。本次研究结果显示,观察组的就医依从性、临床安全感以及生活质量的评分都明显高于对照组,而观察组的临床不良事件发生率

3.03%且显著低于对照组21.21%,组间差异都具有统计学意义(P 均<0.05)。由此可得,泌尿外科的护理安全管理中应用护理标识能够提高临床护理效果,降低不良事件的发生率,促进护患关系的和谐,值得临床应用。

参考文献:

- [1] 沙小希. 护理标识在泌尿外科护理安全管理中的应用效果分析[J]. 影像研究与医学应用, 2018, 2(01):209-210.
- [2] 李宏, 舒谦, 张丹, 等. 护理标识在泌尿外科护理安全管理中的应用效果[J]. 航空航天医学杂志, 2018, 29(08):1028-1030.
- [3] 史秀清. 探讨护理标识在泌尿外科护理安全管理中的应用[J]. 世界最新医学信息文摘, 2019, 19(57):302+310.
- [4] 曾琳, 李萍. 护理标识在泌尿外科护理管理中的应用价值分析[J]. 中国卫生产业, 2019, 16(21):73-74.

(上接第114页)

腹腔镜手术对患者机体造成的创伤较小,并发症发病率比较低,因此适合一些无法耐受开腹手术的患者。细节护理就是以患者为中心的新型护理手段,旨在为患者提供更加优质、安全的护理,相比传统护理,细节护理能够根据患者的需求,从生理和心理上满足患者的需求^[5]。

综上所述,为老年腹腔镜手术治疗患者采取手术室细节护理,能够有效提高护理效果,改善患者手术治疗各项指标,促进患者术后机体的恢复,改善患者不良心理障碍,提高患者对护理的满意度,同时改善预后效果。

参考文献:

- [1] 张雪梅. 分析手术室细节护理在老年患者腹腔镜手术中的临床使用效果[J]. 临床医药文献电子杂志, 2018, 5(58):104, 106.
- [2] 申丽霞. 老年患者腹腔镜手术中手术室细节护理的效果分析[J]. 基层医学论坛, 2019, 23(3):358-359.
- [3] 刘倩玫. 老年患者腹腔镜手术中使用手术室细节护理的效果评价[J]. 心理月刊, 2019, 14(9):25-26.
- [4] 何钊. 手术室细节护理在老年肿瘤患者腹腔镜手术中的应用效果[J]. 饮食保健, 2018, 5(24):120-121.
- [5] 李春梅, 李双喜. 手术室细节护理在老年患者腹腔镜手术中的应用效果分析[J]. 中国保健营养, 2018, 28(1):234-235.

(上接第115页)

指标方面,研究组各项生活质量评分明显高于参照组,差异

有统计学意义, $p<0.05$;

表 2: 各组生活质量评分结果 ($\bar{x} \pm s$, 分)

分组	社会生活	心理功能	物质生活	躯体功能
研究组	83.28±7.52	79.52±5.30	75.81±12.49	81.44±11.58
参照组	64.17±5.42	57.43±3.21	69.84±10.42	65.74±9.75

注: 两组对比, $p<0.05$

3 讨论

乳腺癌根治术患者中运用合理的护理工作可以有效的优化其治疗体验,辅助疾病更好的治疗恢复。要充分考虑到乳腺癌的特殊性,其改变了女性第二性特征,会降低患者自身的自信心,甚至影响夫妻生活。而随着疾病的年轻化,甚至部分未婚患者会更为介意自身治疗后身体外形上的改变与残缺,容易产生自卑心理。要注重患者心理建设,避免其不良情绪对患者治疗依从性的影响,同时也降低负面情绪下的患者对家庭关系构成的伤害。要引导患者与家属构建和谐的家庭氛围,对患者自身疾病控制与家庭成员都有更好的帮助价值。

综上所述,乳腺癌根治术患者中运用护理能干预后可以帮助优化患者护理满意度,优化整体的生活质量。

参考文献:

- [1] 梁梅. 心理护理干预对乳腺癌根治术患者术后疼痛及生活质量的影响[J]. 养生保健指南, 2019, (33):274.
- [2] 张越. 综合护理干预对老年乳腺癌患者根治术后患肢功能锻炼依从性及生活质量的影响[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2019, 4(27):146, 151.
- [3] 马秋华. 协同护理干预对乳腺癌根治术患者术后并发症及生活质量的影响[J]. 中外女性健康研究, 2018, (9):99, 150.