

探讨小儿先天性心脏病护理中不安全因素

郭永红

黑龙江省牡丹江心血管病医院

【摘要】目的 探讨小儿先天性心脏病护理中存在的不安全因素情况。**方法** 在2017年2月至2018年2月期间来我院就诊的先天性心脏病患儿中选取40例,对所有患儿的临床资料进行调查分析,明确护理工作中存在的不安全因素。**结果** 相关资料分析结果显示,小儿先天性心脏病护理工作中存在的不安全因素包含医院设施缺陷、病情本身特点、家属过度紧张、工作人员专业水平不佳、缺乏沟通等,其中工作人员的护理水平属于重要的影响因素。**结论** 将小儿先天性心脏病护理人员的工作水平、家属对疾病得到认知度、医院设施水平等提升,与患儿进行良好交流,并对病情变化予以密切观察,使患儿尽早恢复健康。

【关键词】 小儿;先天性心脏病;护理;不安全因素

【中图分类号】 R473.72

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2020) 02-126-02

现今小儿先天性心脏病具有较高的发生率,因患儿自身免疫力较差,患儿家属对疾病的意识较差,使治疗难度增大,在治疗中具有较差的依从性,对治疗效果造成影响^[1]。对先天性心脏病患儿实施有效的科学护理服务十分重要,在护理工作具有较多的不安全因素。

1 基线数据与方法

1.1 基线数据

在2017年2月至2018年2月期间来我院就诊的先天性心脏病患儿中选取40例,其中男患儿有22例,女患儿有18例,年龄选自0.5岁至8岁,年龄均值为 (4.12 ± 0.84) 岁;40例患儿中,有10例房间隔缺损患儿、有12例室间隔缺损患儿、有8例肺动脉狭窄患儿、有6例动脉导管未闭患儿、有4例肺高压患儿。

1.2 方法

对全部患儿的临床资料进行分析,并总结不安全因素,并采取相应的措施进行预防。

2 结果

相关资料分析结果显示,小儿先天性心脏病护理工作中存在的不安全因素包含医院设施缺陷、病情本身特点、家属过度紧张、工作人员专业水平不佳、缺乏沟通等。

病情本身特点:因心脏病十分复杂,具有较高的发病率和致死率,一旦监测不到位,会将最佳治疗时间错过,严重影响患者的生命安全^[2]。

医院设施缺陷:因儿童存在一定差异性,具有较低的安全意识、疾病意识、抵抗力水平,需得到护理人员的时刻陪伴、监控,将医院设施水平提升。现阶段患儿的病房中仅有一个护理人员,病床与其他患者一直,如护理人员出现疏忽情况,小儿可能出现自主拔针、乱踢乱动、床上跌落等情况,对治疗效果造成影响,威胁生命健康。

工作人员专业水平不佳:对护理工作中存在的不安全因素进行调查,专业工作人员需掌握相关心理学基础知识和护理知识外,需对其护理诊疗技术、规章制度等予以熟练掌握。主要包含:会诊、查对、交接、抢救、纠纷登记制度等。对于小儿先天性心脏病患儿而言,在实施护理服务时,极易出现记录不全、交接不当、记录误差等情况,影响患儿病情的准确性和真实性,使治疗方法受到影响。护理人员针对年龄较小的患儿,其十分恐惧治疗,不能积极配合治疗,因此护理工作需具有较高的护理操作能力。根据实际情况,护

理人员操作水平存在局限性,不能对患儿实施有效的用药干预,影响治疗效果^[3]。

家属过度紧张:因大多数患儿均为独生子女,属于家庭中心,患儿长时间处于高度紧张状态,因对患儿十分关心、担心、溺爱等,不严格遵循医嘱实施护理服务,影响患儿的生命健康。

缺乏沟通:护理人员不能与患儿和家属进行良好交流,其沟通能力较差、主观意识较差等。护理人员对患儿的主观意愿不能十分了解,对护理服务水平具有较高的水平,极易出现纠纷事件,缺少理性交流,影响护患关系。

3 讨论

在心血管疾病中小儿先天性心脏病十分常见,此种疾病的患病因素,有关资料证实,此疾病具有较低的遗传率,因孕妇在怀孕期间受年龄、环境影响,极易受药物刺激、病毒感染、接触放射线等因素造成^[4]。在怀孕期间注意安全、保证健康生活习惯和饮食,将先天性心脏病患病几率降低。但先天性心脏病发病情况不能完全避免,因此实施针对性护理干预,将不安全因素予以避免,将效果提升。

以上结果显示,小儿先天性心脏病护理工作中存在的不安全因素包含医院设施缺陷、病情本身特点、家属过度紧张、工作人员专业水平不佳、缺乏沟通等。

针对其采取相应的措施避免不安全因素:(1)增强医院设施管理水平:选择适合儿童的病床,密切监测儿童病房情况,要求专业人员定时查看医院的基础设施,一经出现相关内容,对其进行及时上报,并采取有效措施进行解决,定期对病房进行消毒^[5]。(2)对患儿和患儿家属进行安全教育:对病情进行密切关注,因对心脏病基础情况不是十分了解,不能在一定时间内进行有效的护理干预,且不能实施科学的护理服务。对患儿和家属予以相应的健康宣教,并更多的了解心脏病知识,将治疗效果提升,在紧急时刻实施应激措施,争取有效的治疗时间。(3)提升护理人员的素质:重视护理人员的专业水平,对患儿的康复情况造成直接影响。因此将护理人员的综合素质予以提升,将操作能力和专业水平予以提高。对护理人员进行定期学习和培训,将护理人员的考核和管理能力予以提升。严格遵守相关制度,将安全意识提升。护理人员需将自身责任意识提升,做到爱岗敬业,重视患儿的身心变化和健康情况。(4)加强沟通:护理人员不能与患儿进

(下转第128页)

相应的管理策略^[4]。护理人员分层级管理模式,可以确保护理工作和护理人员职称、沟通能力、资历、协调能力相匹配,明确各层级护士的责任区域和职责范围,并指导和监督各层级护士履行其护理工作,可以在充分发挥每一位护理人员的潜能,满足临床医生和患者不断增长随同加大的护理需求的同时,把护理工作尽可能标准化与规范化,确保护理质量。而定期开展针对性的培训,可以此促使护理人员能顺利完成护理工作,并让护理工作的质量得到保障^[5]。根据本文的对比结果表明,两组护理人员接受不同管理措施之后,观察组护理人员的综合素质评分及工作质量评分均显著高于对照组(P 均 <0.05)。数据说明,相对于常规护理管理,层级护理管理的应用能让护理人员有更多提升能力的机会,并且能让其从高层级护理人员处得到更多临床经验,因此其能让护理人员在日常工作中不断提升自身的综合素质,对医院的长远发展有很大帮助。

综上所述,医院不断进行护理管理模式的创新,将先进的护理管理理念与日常护理工作进行有效的结合,应用层级

护理管理,合理利用护理人员资源进行护理工作,并将培养和提高护理人员的综合素质纳入日常的护理管理工作内容之中,实现护理工作的科学化管理,可以有效提高护理工作质量,为医院的可持续发展注入动力,具有临床应用价值。

参考文献:

- [1] 冯英兰,王晶.层级护理管理模式对护士综合素质和工作能力的影响[J].实用临床护理学电子杂志,2018,3(22):162-163.
- [2] 刘海英.护士分层级管理模式对提高护理管理质量的作用分析[J].中国卫生产业,2019(19):116-117.
- [3] 郝香敏.护士层级管理对病房护理管理质量及患者满意度的影响[J].齐鲁护理杂志,2018,24(03):21-23.
- [4] 张玲,童梅,江丽.层级管理对提高普外科护理工作质量和护士工作能力的影响效果观察[J].中国卫生产业,2019,16(07):64-65.
- [5] 任秋芳.分析护士分层级管理模式对提高护理管理质量的作用[J].实用临床护理学电子杂志,2018,3(09):161.

(上接第124页)

急性脑梗死早期静脉溶栓治疗中运用护理干预,可以更好的辅助治疗得到疾病恢复。护理的目的一方面是保证治疗顺畅进行,避免患者生理、心理或者认知层面构成的阻力,另一方面,可以让患者有更好的治疗恢复舒适度,提升恢复效果与速度,减少患者身心不适感,患者对护理与治疗工作的认可度更高,保持和谐护患关系,减少矛盾冲突。在具体的护理沟通中,护理人员要懂得患者心理学、社会学、法律常识、沟通技巧等,要懂得通过指导来安抚患者情绪,同时要保持规范操作,避免触碰法律条例,要懂得操作的规范边界,避免越界操作。要懂得通过合理的沟通来了解患者,同时也更好的让患者接受自己的健康教育,认可自身工作。由此来优化教育指导效果。甚至要进行护理人员健康教育学习,

了解技巧,知晓内容,提升整体工作效果。

总而言之,急性脑梗死早期静脉溶栓治疗中采用护理干预后可以有效辅助治疗发挥效果,同时减少并发症,患者恢复情况更好。

参考文献:

- [1] 王敬华.早期静脉溶栓治疗急性脑梗死的护理干预[J].吉林医学,2019,40(8):1883-1884.
- [2] 詹忠琴.护理干预在早期静脉溶栓治疗急性脑梗死中的作用评价[J].健康必读,2019,(22):81.
- [3] 高冠彩,刘桂兰.急性脑梗死超早期使用阿替普酶静脉溶栓治疗的护理干预研究[J].中国社区医师,2019,35(20):130-131.
- [4] 王立波.护理干预在早期静脉溶栓治疗急性脑梗死中的疗效观察[J].中国医药指南,2019,17(10):242-243.

(上接第125页)

3 讨论

光照射治疗属于临床新型用于治疗痤疮的手段,蓝红光照射不仅提高了治疗效果,还有利于控制面部瘢痕的生成,通过蓝红光照射有利于促进面部创面的痤疮丙酸杆菌内源性光敏物质的活性,进而消灭细菌,红光能够缓解痤疮炎症,从而获得医护人员及患者的认可。

综上所述,为采取蓝红光照射治疗痤疮患者实施皮肤护

理后,不仅能够有效降低不良反应率提高患者对护理的满意度,还能提高护理质量保证护理有效率,为患者提供安全、有效的护理手段,有助于促进患者疾病的康复。

参考文献:

- [1] 魏丽虹.皮肤护理在蓝红光照射治疗痤疮中的临床效果评估[J].医学综述,2015,(3):558-559,560.
- [2] 李俊伟.面部皮肤护理在痤疮患者中的应用效果[J].河南医学研究,2019,28(23):4378-4380.

(上接第126页)

行有效沟通,对患儿的家属的意愿予以充分了解,依照实际情况实施护理服务。患儿家属对患儿行为、语言上受到的刺激十分担心,护理人员需对其进行开导、讲解。

综上所述,寻找小儿先天性心脏病护理工作中存在的不安全因素,并针对其实施相应的方法,将医院相关设备水平提升,与患儿进行有效交流,对病情变化予以密切观察,有利于患儿尽早恢复健康。

参考文献:

- [1] 黄林英.小儿先天性心脏病护理中不安全因素分析[J].

医学美容(中旬刊),2015(3):41-42.

- [2] 魏云霞.护理安全管理对低体重先天性心脏病患儿术后恢复的影响分析[J].世界临床医学,2016,10(15):214.
- [3] 薛丽华.预见性护理在先天性心脏病患儿安全护理中的应用[J].全科护理,2018,16(19):2399-2400.
- [4] 傅燕青,王维.西乡街道2007—2011年5岁以下儿童死亡原因分析与干预措施[J].中国卫生产业,2012(34):172-173.
- [5] 潘晓兰,王海霞,张静等.护理安全管理对低体重先天性心脏病患儿术后恢复的影响[J].齐鲁护理杂志,2012,18(5):73-74.