

# 多元化护士行为角色转变在神经外科介入护理中的应用

龚绍玲

昆明市第一人民医院神经外科 650000

**【摘要】目的** 探讨多元化护士行为角色转变在神经外科介入护理中的应用。**方法** 选择2018年10月至2019年9月我所接受介入护理得神经外科患者120例作为研究对象,采用随机数字法,分为对照组和观察组,每组各60例,对照组给予常规责任制护理,观察组护士进行多元化行为角色转变为患者提供全方位的护理。比较两组患者的护理满意率和复查率。**结果** 观察组患者对整个护理的满意率(95%)明显高于对照组(80%)( $\chi^2=4.687$ ,  $P=0.036$ ),观察组患者的复查率(11.67%)明显低于对照组(21.67%)( $\chi^2=3.664$ ,  $P=0.029$ )。**结论** 在神经外科介入护理中给予多元化护士行为角色转变能够得到较高的满意率,降低复查率,得到理想的效果,值得推广。

**【关键词】** 多元化护士行为; 角色转变; 神经外科

**【中图分类号】** R473

**【文献标识码】** A

**【文章编号】** 2095-9753 (2021) 01-118-02

神经外科作为外科学中的一个分支,是在外科学以手术为主要的治疗手段的基础上运用特别的神经外科学的研究方法,去研究人体的神经系统,如脑、脊髓及其周围的神经系统,还有与之相关的一些附属结构<sup>[1]</sup>。神经外科是主治由于外伤而导致脑部、脊髓等神经系统的疾病,例如脑出血出血量危及生命,车祸导致脑部外伤或者脑部有肿瘤压迫需要手术治疗等等<sup>[2]</sup>。目前对神经外科患者在手术结束后的护理是十分重要的,因此本文以神经外科患者为研究对象,探讨多元化护士行为角色转变在神经外科介入护理中的应用,报道如下。

## 1 资料与方法

### 1.1 临床资料

选择2018年10月至2019年9月我所接受介入护理得神经外科患者120例作为研究对象,采用随机数字法,分为对照组和观察组,每组各60例。观察组中男38例,女22例,年龄38-63岁,平均年龄 $50.5 \pm 3.64$ 岁;对照组中男40例,女20例,年龄40-67岁,平均年龄 $53.5 \pm 4.95$ 岁。

### 1.2 方法

对照组给予常规责任制护理。护士需要履行责任制护理职责并展开相关的护理工作,需要遵循医嘱实施相关的治疗和护理措施,完成自己所需要完成的工作。

观察组护士进行多元化行为角色转变为患者提供全方位的护理。护士人员需要在患者从开始住院到出院的整个过程中指定一名经过专业培训的护士参与其中,并负责照看整个护理全程。在整个过程中护士需要完成病情责任护理,陪检护士,导管室护士,下级医生以及一些亲朋好友甚至到患者家属等角色的灵活转变,给患者提供一个心理上的支持和细致全面的护理。

### 1.3 观察指

(1) 护理满意率<sup>[3]</sup>。对两组患者的护理满意进行调查,0-100分,85分及以上则视为满意,低于85分则为不满意,分数越高则说明患者对整个护理越满意。

(2) 复查率。观察记录经过治疗的患者,并督促其定期复诊,根据所有患者在出院后是否复查的人数进行准确的统计,并对比两组患者的复查率。

### 1.4 统计分析

采用SPSS18.0软件处理,计数资料行 $\chi^2$ 检验,采用n(%)表示,计量资料行t检验,采用( $\bar{x} \pm s$ )表示, $P < 0.05$ 差异

有统计学意义。

## 2 结果

### 2.1 两组患者护理满意率

观察组患者对整个护理的满意率(95%)明显高于对照组(80%)( $\chi^2=4.687$ ,  $P=0.036$ ),见表1。

表1: 两组患者护理满意率对比[n(%)]

| 组别       | 例数 | 满意 | 不满意 | 总满意率  |
|----------|----|----|-----|-------|
| 对照组      | 60 | 48 | 12  | 80.00 |
| 观察组      | 60 | 57 | 3   | 95.00 |
| $\chi^2$ |    |    |     | 4.687 |
| P        |    |    |     | 0.036 |

### 2.2 两组患者复查率

观察组患者的复查率(11.67%)明显低于对照组(21.67%)( $\chi^2=3.664$ ,  $P=0.029$ ),见表2。

表2: 两组患者复查率对比[n(%)]

| 组别       | 例数 | 复查人数 | 未复查人数 | 总复查率  |
|----------|----|------|-------|-------|
| 对照组      | 60 | 13   | 47    | 21.67 |
| 观察组      | 60 | 7    | 53    | 11.67 |
| $\chi^2$ |    |      |       | 3.664 |
| P        |    |      |       | 0.029 |

## 3 讨论

随着现在护理学的飞速发展,整体化的护理推广,护士的职能也从局限变得多元化,这样患者才能更好地服务患者,即专职护士需要进行多元化的角色转变,这样患者才能够得到全方面细致的护理,专职护士在整个护理过程中能够转变为多个角色。如病区责任护士:对刚入院的患者进行宣教,是患者能够放轻松,安心接受治疗;陪检导诊护士角色:专职护士陪同患者完成各项的检查,做好全面的解释宣教工作,使患者感受到“宾至如归”的感觉;导管室护士角色:在患者进入导管室后会对里面各种仪器感到恐慌,所以护士需要全程陪护在患者身边,缓解患者紧张的情绪,使患者能够安心接受治疗;下级医生角色:护士能够做到熟悉掌握患者所有的治疗进程,遵循医嘱,配合主治医师完成各项工作,手术时能够了解手术进展,默契配合医生工作,对手术中可能出现的情况做好预判和准备,确保手术能够万无一失,并且能够记录手术中的一些小细节,为手术后医生的手术记录提

(下转第122页)

## 3 讨论

泌尿系统疾病是一种发病率较高的疾病,还具有一定的隐私性<sup>[4]</sup>。在治疗中一般使用手术治疗,手术属于应激事件,很容易增加患者的心理负担,造成焦虑、抑郁情绪,从而导致在手术中发生应激性反应,影响患者的预后<sup>[5]</sup>。使用心理护理干预,可以缓解不良情绪,提高生存质量。护理人员主动向患者讲解手术中注意事项,流程,疾病预后的情况等,对患者进行心理疏导。

本文中选取 90 例在 2019 年 9 月到 2020 年 9 月治疗泌尿外科腹腔镜手术治疗的,使用心理护理干预的患者生存质量评分明显高于使用常规护理的患者,并且患者的焦虑情绪,抑郁情绪较少,患者护理满意率较高。

综上,在泌尿外科腹腔镜手术治疗的,使用心理护理干预,可以明显改善患者的心理状态,提高生存质量,让患者感到满意。

(上接第 118 页)

供了重要的依据;消息传递者角色:在手术时能够将信息传递给患者家属,是患者能够安心接受治疗,家属能够安心等待,专职护士必须拥有相当的耐心,服务好患者;患者及其亲属代言人的角色:给患者提供强大的心理支撑,拉近与患者的距离,并且能够将患者的问题及时反映给主治医生,方便及时改正和修改<sup>[4]</sup>。本次研究中,观察组患者对整个护理的满意率(95%)明显高于对照组(80%)( $\chi^2=4.687$ ,  $P=0.036$ ),说明多元化护士行为角色转变在治疗中能够得到患者更多的满意率;观察组患者的复查率(11.67%)明显低于对照组(21.67%)( $\chi^2=3.664$ ,  $P=0.029$ ),说明多元化护士行为角色转变在治疗中能够降低复查率。

综上所述,在神经外科介入护理中给予多元化护士行为角色转变能够得到较高的满意率,降低复查率,得到理想的

(上接第 119 页)

状态的免疫功能,从而使得甲亢的病情恶化。因此治疗中既要注意血糖的水平又要注意甲亢的病情,所以合理的护理是非常有必要的<sup>[4]</sup>。

本次实验中发现,饮食护理实验的方法与参照组常规的护理方法相比其并发症的发生率大大降低并且提高了护理的满意度,更有效的缓解了医生和患者之间的关系,而且饮食护理比药物治疗的安全性更好,也体现了以人为本的护理理念,让身体里达到了平衡。

综上所述,饮食实验的护理方法效果明显,满意度高,值得在甲亢合并糖尿病护理中得到广泛的应用。

(上接第 120 页)

患儿的术后恢复情况。

## 参考文献:

- [1] 曹芳,方识进,华山,等.电子纤维支气管镜治疗小儿气管支气管异物 101 例临床疗效分析[J].安徽医药,2020,24(2):370-372.
- [2] 李茜梅,罗冷,周亚平,等.临床护理路径在纤维支气管镜检查患儿围术期的应用效果[J].安徽医学,2020,41(5):591-593.

## 参考文献:

- [1] 廖芳.快速康复外科护理在泌尿外科后腹腔镜手术患者中的应用效果分析[J].中外医学研究,2020,18(24):99-101.
- [2] 刘付海平,李梅,朱冬玲,欧法玲.外科快速康复联合心理护理用于泌尿外科手术患者中的价值[J].智慧健康,2020,6(23):125-127.
- [3] 陈瑞燕.FTS 理念联合心理护理在泌尿外科老年患者后腹腔镜围术期护理的应用研究[J].医学食疗与健康,2019(13):136-137.
- [4] 郭招治,王姣莲,左露露.心理护理干预对泌尿外科腹腔镜手术后提高患者生存质量及心理状态的影响[J].国际护理学杂志,2019(17):2758-2760.
- [5] 郑娟如,郑娟璇,周映吟,张永海,吴丹燕,黄旭华.FTS 理念联合心理护理在泌尿外科老年患者后腹腔镜围术期护理的应用研究[J].中国医药科学,2018,8(07):114-117.

效果,值得推广。

## 参考文献:

- [1] 白娟,杨健.跨理论模型与多学科协作方案在神经外科病区护理中的应用[J].海军医学杂志,2020,041(002):212-214.
- [2] 陈沁,胡琴.基于微信平台的信息传递模式在神经外科重症管理中的应用[J].中国临床神经外科杂志,2018,23(10):690-691.
- [3] 邵宇,蒋伶俐,刘玉梅,等.微课+病例分析的 FCM 模式在神经外科护理带教中的应用[J].西南国防医药,2020,30(02):53-54.
- [4] Ouslander J G, Engstrom G, Reyes B, et al. Management of Acute Changes in Condition in Skilled Nursing Facilities[J]. Journal of the American Geriatrics Society, 2018, 66(12):2259-2266.

## 参考文献:

- [1] 牛光美.饮食护理在甲亢并糖尿病患者护理中的应用疗效评价[J].饮食保健,2019,6(047):195-196.
- [2] 周桂荣.饮食护理在甲状腺功能亢进症(甲亢)合并糖尿病患者护理中的作用分析[J].饮食保健,2019,6(011):138-139.
- [3] 徐丽.甲状腺功能亢进合并 2 型糖尿病患者的护理策略探析[J].名医,2020,80(01):174-174.
- [4] 陈雪云,阮惠清.饮食护理在甲状腺功能亢进症合并糖尿病患者护理中的效果实验[J].实用临床护理学电子杂志,2020,5(19):24-24.

[3] 郑伟,王革力,毛宁.早期纤维支气管镜灌洗吸痰在微创食管癌术后肺部并发症中的临床研究[J].中华老年医学杂志,2020,39(3):269-272.

[4] 岳芳,刘艳芳,杨帆,等.纤维支气管镜肺泡灌洗治疗小儿急性肺炎的疗效观察[J].河北医药,2019,41(18):2735-2739.

[5] 李鑫,王晓艳,崔蕾.集束整合多维度干预策略应用于纤维支气管镜下取异物患儿对其炎症吸收和并发症的影响[J].中国妇幼保健,2020,35(11):2017-2020.