

骨科护理管理中运用护理安全管理的效果分析

张 琪

兰州市第一人民医院骨科 730050

【摘要】目的 探讨骨科护理管理中运用护理安全管理的效果分析。**方法** 选择2019年2月至2020年2月我院骨科所接收治疗的患者110例作为研究对象,采用随机数字法,分为对照组和观察组,每组各55例,对照组给予常规护理,观察组给予护理安全管理。比较两组患者并发症的发生率和不良事件发生率。**结果** 观察组患者出现压疮、肠粘连和下肢静脉血栓等并发症的总发生率(7.27%)明显低于对照组(20%)($\chi^2=4.357$, $P=0.042$),观察组患者出现跌倒、坠床等其他不良事件的发生率(10.92%)明显低于对照组(21.82%)($\chi^2=5.394$, $P=0.039$)。**结论** 在骨科护理管理中运用护理安全管理能够降低并发症的法案胜利,降低不良事件的发生率,有较好的临床效果,值得推广。

【关键词】 骨科护理; 护理安全管理; 效果分析

【中图分类号】 R473.6

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2021) 02-105-02

骨科作为临床治疗中的一个重要科室,其就诊人数往往较多,并且主要是由于意外伤害而发生骨折性疾病。所以患者需要得到及时有效的治疗,如果患者在住院期间发生一些护理安全事故,这会使其病情大大加重,严重者甚至会威胁生命,但随着现在社会的不断发展,医疗技术和人们的生活水平在不断的提高,人们对医疗安全的要求也在慢慢提高,所以护理人员对相应的风险事故需要防患于未然,在积极治疗疾病的同时还要做好相应的管理工作。因此本文以骨科所接受治疗的患者作为研究对象,探讨骨科护理管理中运用护理安全管理的效果分析,报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选择2019年2月至2020年2月我院骨科所接收治疗的患者110例作为研究对象,采用随机数字法,分为对照组和观察组,每组各55例。观察组中男32例,女23例,年龄25-52岁,平均年龄 38.5 ± 3.65 岁;对照组中男36例,女19例,年龄27-56岁,平均年龄 41.5 ± 4.39 岁。

1.3 方法

对照组给予常规护理。护理人员需要督促提醒患者按时用药,注意饮食平衡,保持心理平衡,关注好患者的具体病情,遵守无菌原则。

观察组给予护理安全管理。主要包括:(1)制定安全管理制度:护理人员需要根据骨科管理制度,进行逐条落实,规范好每个护理人员的行为操作,确保每一个环节都安全可靠,并且做好防止发生护理安全事故,避免人为差错的出现。在整个过程中不断对项目进行完善和改进,明确每个人的分工任务,可是需要对护理群体定期展开一些培训,全面提升护理人员的护理质量,充分激发每一个护理人员的工作积极性和责任意识。做好落实护理分级的管理体系的工作,将风险管理全面落实增强护理人员安全意识。(2)护理理念的更新:在对患者进行护理工作前,以患者为中心作为护理切入点,对患者疾病进行全面的了解,制定个性化的护理方案,积极与患者进行交流,消除患者产生的负面情绪,对护理风险进行评估并做好防范措施,在患者的药物上贴好注意事项及用药量,叮嘱患者一些用药风险。(3)做好环境安全管理:护理人员需要在开关处提示冷热水,在容易滑倒的地放置防滑垫,并在墙壁上贴上提示标语,床边设置呼叫器,尖锐物

品需要远离病人,用海绵条贴在所有家具的棱角处,在病床周围设好防护栏,厕所旁设置扶手避免患者跌倒。

1.4 观察指标

(1)并发症的发生率。观察记录两组患者出现压疮、肠粘连和下肢静脉血栓等并发症的发生情况,计算出两组患者并发症的总发生率并进行对比。(2)不良事件发生率。观察记录两组患者出现跌倒、坠床等其他不良事件发生情况,计算出不良事件的发生率并将两组进行对比。

1.5 统计分析

采用SPSS18.0软件处理,计数资料行 χ^2 检验,采用n(%)表示,计量资料行t检验,采用($\bar{x} \pm s$)表示, $P < 0.05$ 差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者并发症的发生率

观察组患者出现压疮、肠粘连和下肢静脉血栓等并发症的总发生率(7.27%)明显低于对照组(20%)($\chi^2=4.357$, $P=0.042$),见表1。

表1: 两组患者并发症的发生率对比[n(%)]

组别	例数	压疮	肠粘连	下肢静脉血栓	总发生率
对照组	55	4 (7.27)	5 (9.10)	2 (3.64)	11 (20.00)
观察组	55	1 (1.82)	2 (3.64)	1 (1.82)	4 (7.27)
χ^2					4.357
P					0.042

2.2 两组患者不良事件发生率

观察组患者出现跌倒、坠床等其他不良事件的发生率(10.92%)明显低于对照组(21.82%)($\chi^2=5.394$, $P=0.039$),见表2。

表2: 两组患者不良事件发生率对比[n(%)]

组别	例数	跌倒	坠床	其他	总发生率
对照组	55	4 (7.27)	3 (5.45)	5 (9.10)	12 (21.82)
观察组	55	2 (3.64)	1 (1.82)	3 (5.45)	6 (10.92)
χ^2					5.394
P					0.039

3 讨论

医疗纠纷的主要原因是由于安全管理不到位,并且骨科相较于其他科室危险系数更高,并且加上一些护理人员没有足

(下转第108页)

1.4 数据处理

数据应用 SPSS18.0 展开分析与处理, 对于计数资料 (并发症) 使用 % 百分数来表示, 检验应用卡方值 χ^2 ; 计量资料 (住院时间与护理评分) 则使用 t 值来表示, 检验应用 ($\bar{x} \pm s$), $P < 0.05$ 提示有显著差异。

2 结果

2.1 观察手术后并发症发生情况

由表 1 得出, 经实施不同护理方案后, 两组术后均有患者出现并发症, 但相较于对照组, 实验组总发生例数较少 ($P < 0.05$)。

表 1: 观察手术后并发症发生情况 (n, %)

组别	例数	皮下气肿	胆漏	胆道感染	总发生
对照组	46	3	2	4	9 (19.6)
实验组	46	0	1	1	2 (4.3)
χ^2 值	-	-	-	-	5.0595
P 值	-	-	-	-	< 0.05

2.2 观察两组住院时间及护理服务评分

对照组 (n=46): NSNS 评分为 (79.36 $\pm$ 4.60) 分, 住院时间为 (9.87 $\pm$ 0.25) d。

实验组 (n=46): NSNS 评分为 (86.72 $\pm$ 3.28) 分, 住院时间为 (6.57 $\pm$ 1.27) d。

与对照组相比, 实验组住院时间与护理评分均较优, $T=8.8356$ 、 14.0428 ($P < 0.05$)。

3 讨论

(上接第 104 页)

以及患者对护理人员的配合度, 有效的提升患者的预后效果。在临床上值得推广和使用。

参考文献:

(上接第 105 页)

够的安全意识、操作不够熟练等。所以在平常的护理工作中需要对护理人员进行专业全面的培训, 鼓励其与患者进行沟通, 简答患者疑惑, 从而减少患者所产生的抵抗情绪。在护理过程中, 护理人员还需要换位思考, 具备相当的识别危险的能力, 做好安全管理工作, 严格遵守风险管理制度。本次研究中, 观察组患者运用护理安全管理, 观察组患者出现压疮、肠粘连和下肢静脉血栓等并发症的总发生率 (7.27%) 明显低于对照组 (20%) ($\chi^2=4.357$, $P=0.042$), 说明护理安全管理能够降低并发症的发生率; 观察组患者出现跌倒、坠床等其他不良事件的发生率 (10.92%) 明显低于对照组 (21.82%) ($\chi^2=5.394$, $P=0.039$), 说明护理安全管理能够降低不良事件的发生率。

综上所述, 在骨科护理管理中运用护理安全管理能够降低并发症的法案胜利, 降低不良事件的发生率, 有较好的临

(上接第 106 页)

普通护理组的 86.7%, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。可见, 细节护理应用在骨外科护理工作中有着较好的效果, 能够让护理工作更加重视细节中的一些问题, 同时提高自己的专业技能, 并且在激励措施的激发下, 更大积极性投入到工作中, 提高其护理能力, 而由此也能够更好的与医生做好配合, 也提高了对患者的服务态度和服务质量。

综上所述, 将细节护理应用在骨外科护理中, 能够提高

胆结石疾病的发生主要与饮食结构、生活方式等因素有着密切关联, 不仅严重影响到患者身心健康, 还会对日常生活造成较大影响^[3]。腹腔镜治疗胆结石患者, 具有术后恢复快、术中出血少、创伤小等优点, 并辅以优质护理干预, 可加快患者恢复速度^[4-6]。本次研究中, 实验组在实施优质护理后, 术后并发症发生率低, 住院时间短, 且护理服务满意度评分较高, 临床应用意义较高。

综上所述, 相较于常规护理, 对实施腹腔镜治疗胆结石的患者在手术中展开优质护理干预, 可得到确切干预效果, 利于患者尽快恢复健康, 值得临床深入研究与推广应用。

参考文献:

[1] 朱金玲, 杨艳, 朱宇. 探讨腹腔镜胆结石微创手术后的优质护理效果 [J]. 中国保健营养, 2020, 030(004):58-59.

[2] 杨艳, 朱金玲, 雷洋. 探究腹腔镜手术应用于胆结石患者的术后护理效果 [J]. 心理月刊, 2020, 15(03):120-120.

[3] 张月. 胆囊结石患者经腹腔镜胆囊切除手术配合效果观察 [J]. 航空航天医学杂志, 2019, 030(008):P.1020-1021.

[4] 于晓艳. 胆结石患者腹腔镜胆囊切除术围手术期护理的方法及效果 [J]. 中国医药指南, 2019, 17(30):386-387.

[5] 李俊红. 胆结石患者行腹腔镜治疗的手术室护理措施 [J]. 中国卫生标准管理, 2019, 010(004):144-146.

[6] 邹慧娟、陈静、敖渝娟等针对性护理对胆囊结石合并胆囊炎患者腹腔镜术后康复进程的影响 [J]. 临床医药实践, 2020, 310(11):80-82.

[1] 刘晓青. 护理干预措施对慢阻肺急性发作的影响分析 [J]. 实用临床医药杂志, 2019, 18(14):95.

[2] 潘珊玲, 段琦, 陈丹红. 优质护理在提高老年慢阻肺患者肺功能和生活质量中的应用 [J]. 中外医学研究, 2019, 15(6):76-77.

床效果, 值得推广。

参考文献:

[1] 陈红梅. 骨科护理管理中应用互动管理模式的效果研究 [J]. 实用心脑血管病杂志, 2018, 026(0z1):313-314.

[2] 刘春香, 韦涌初, 汪莉, 等. 失效模式和效应分析联合 APACHE II 评分在 ICU 护理安全管理中的应用及效果评价 [J]. 护士进修杂志, 2018, v.33(08):17-19+23.

[3] 鲍映雪, 孙柳君, 袁勉, 等. 失效模式与效应分析在手术室护理质量安全管理中的应用效果评价 [J]. 中国药物与临床, 2019, 019(012):2110-2112.

[4] Ouslander J G, Engstrom G, Reyes B, et al. Management of Acute Changes in Condition in Skilled Nursing Facilities [J]. Journal of the American Geriatrics Society, 2018, 66(12):2259-2266.

患者满意度, 有着较好的护理效果。因而, 值得进一步进行深入研究和推广。

参考文献:

[1] 付沙. 细节护理在外科护理管理中的应用探究 [J]. 医药与保健, 2014, 22(11):675-676.

[2] 王学琴. 细节护理在普通外科优质护理服务中的应用 [J]. 吉林医学, 2013(34):165-166.