

异常分娩时麻醉知多少

张 兰

资阳市第一人民医院 641300

〔中图分类号〕R614 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165 (2021) 04-106-01

异常分娩是指因为产力、产道或者是胎儿等其中一个方面产生异常而导致在分娩时胎儿娩出的过程不是非常的顺利。

异常分娩就是俗称的难产，而最普遍的问题就是分娩异常，分娩的时间就会被拉长，这种现象对于母亲以及婴儿的健康和生命的安全都具有极大的风险，同时还会增加分娩期母婴并发症的出现。

1 如何确定是否是异常分娩？

主要有两种方法：一种是利用B超来探查胎儿的胎位是否正常，如果出现横位或者臀位这种异常的情况，应该及时引起重视，并且及时的进行有效的措施。第二种方法：就是利用产程的胎心监护仪进行检查，并且护理人员根据产妇的实际情况如：宫口张开的速度、胎儿的心跳水平等。判断是否是异常分娩，当出现异常分娩的时候可以使用麻醉的方式对产妇进行助产，但是麻醉的方式也要根据产妇的实际情况而决定。

2 选择麻醉的方式

2.1 不宜麻醉的产妇

麻醉的药物没有办法应用在所有的生产过程，所以当产妇有凝血方面疾病的时候，并且产妇的体表经常会出现不明原因的淤血斑以及小红点等，或者伤口不大但是一直流血不止，又或者是在抽血检查的时候，才发现产妇有凝血方面的问题，对于这种情况，产妇是不可以进行麻醉的，这主要是因为使用麻醉剂对产妇进行半身麻醉后，会出现血块，而这些血块则会压迫产妇的神经以及脊髓，这时需要进行手术处理，否则会给脊髓带来永久性的伤害。

2.2 全身麻醉的适用条件

如果产妇在分娩的时候遭到了产科急症，如出现大出血、胎儿窘迫以及胎盘剥离和脐带脱出的现象，这时候就要对产妇进行全身的麻醉，目的是为了麻醉的诱导期缩短，并且快速的进入到麻醉持续期内；全身麻醉可以降低产妇在生产

时的痛感，并且帮助孕妇更加顺利的进行分娩，但是普通生产使用的麻醉要比剖宫产使用的少。

2.3 分娩异常时的麻醉方式

绝大对数的时候，出现异常分娩的时候最主要的辅助生产就是进行剖宫产，但是什么样的麻醉方式才适合剖宫产呢？

在剖宫产手术中，最主要的麻醉方式就是硬膜外麻醉，不管是从安全、镇痛、腹肌松弛以及对母婴的影响等来说都是最优秀的选择，如果不是出现异常的情况，基本上是不会使用全身麻醉的方式的。因为产妇的全身麻醉的时间如果超过了10分钟，将会导致新生儿也出现全身麻醉的现象，会对新生儿的神经系统以及身体的素质造成不利的影响并产生其他的副作用。

一般来说，在出现异常分娩的时候，可以根据不同的情况来选择相应的麻醉的方式：1. 急性胎儿窘迫，如果产妇在分娩的时候，出现急性胎儿窘迫或者是大出血导致产妇出现低血容量休克的现象，就应该立刻终止妊娠，并且利用输血的手段来提升产妇的血容量。并且接下来需要使用局部麻醉的方式对产妇进行接下来的剖宫产手术，并且在很大的程度上提高产妇的分娩速度，避免产妇出现失血性休克或者是向更严重的方面发展。2. 有心脏病的产妇，对于患有心脏病的产妇，在分娩的时候子宫会出现收缩造成心脏泵血量的需求增大，这很有可能会造成产妇出现因为心脏疲惫而引发心力衰竭的现象，从而给产妇以及新生儿造成严重的影响，并且威胁产妇以及新生命的生命安全。所以应该对产妇食用一些镇静的药物，可以有效的控制生产过程中产妇的心率问题，并且保护产妇以及新生命的生命安全，如果情况紧急的话，也可以通过剖宫产手术来对产妇进行分娩，但是一定要保证对产妇的心电图进行严密的监控，并且在产妇进行硬膜外麻醉的时候，一定要去确保对患有心脏病的产妇给予足够的氧气。

老人和孩子尤要当心疝气

张 玲

成都京东方医院 610500

〔中图分类号〕R656.2 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165 (2021) 04-106-02

1 什么是疝气？

当脂肪组织以及器官的一部分以及其他的部分在通过肌肉以及结缔组织比较薄弱的区域的时候就会出现疝，老人和小孩

是好发的人群，腹股沟、腹部是疝最常见的部位，当这些部位出现疝气的时候就会隆起，并且还会随着日常的活动而出现疼痛的现象，并且根据疝的类型以及疝的严重程度会对患者的轻