

脑出血的微创手术

贺 宇

双流区第一人民医院 610000

〔中图分类号〕R743.34

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕2095-7165 (2021) 04-096-01

1 脑出血微创治疗的概念

急性脑出血会导致脑组织直接出现撕裂损伤, 血肿会呈机械性压迫局部的脑组织, 导致颅内压急剧升高, 从而导致脑灌注严重不足, 加剧了脑部的损害。同时脑出血在发生 1-2 天后, 血肿溶解会释放大量的有害因子, 从而造成继发性神经组织损害, 加重神经功能的障碍, 导致难以恢复的情况。如果患者在脑出血后进行一种创伤比较小的手术, 同时还可以及时的清除脑内的血肿, 不仅可以有效的消除脑内的血肿, 还可以减少对脑组织内的各种损害, 有利于脑和全身的生理环境改善, 并且可以在挽救生命的同时减少病残和手术并发症的发生。

2 脑出血微创手术的适应症和禁忌症

脑出血的微创手术适应症, 目前没有统一的意见, 但是会按照以下的原则进行: 1. CT 诊断为自发性幕上 ICH $\geq 30\text{ml}$ 和 $\geq 15\text{ml}$ 小脑出血, 并且产生明显的占位。2. 在患者出血稳定后, 出血 6 小时后 CT 复诊可以确定血肿体积基本等于先前的体积 $< 5\text{ml}$ 。3. 除了脑干外部位的脑出血, 尤其是患者脑深部出血以及脑室出血。4. 患者出现意识障碍或者偏瘫失语以及神经功能损害等症候会加重。5. 高血压会得到较好的控制。微创治疗的禁忌症: 1. 出血量较大, 并且患者的病情危重, 同时还伴有脑疝以及急性颅高压的现象。2. 脑出血尚未稳定, 同时伴有全身出血性疾病的患者。3. 明确的脑血管器质性疾病, 如动脉瘤、脑血管畸形、烟雾病等都会导致自发性脑出血。

3 脑出血微创手术的时机

高血压性脑出血的手术时期, 目前没有确定, 但是一般认为高血压所导致的脑出血多为暂时性的出血, 但是在发病的 24 小时内, 血肿很有可能会进一步的扩大, 并且多发生在 6 小时以内, 所以也基于脑出血的稳定状态和血肿纤溶致神经组织继发损害的时限来说, 目前多主张在出血的 6 小时后, 高血压可以得到有效的控制, 并且 CT 复查显示脑出血没有明显的

进展时, 在进行微创手术。临床上脑出血后, 6-24 小时是被认为进行微创手术治疗的理想时期, 如果出血量较大, 并且全身情况尚好的患者, 可以在 6-7 小时内进行微创手术的治疗。

4 脑出血微创手术方法

微创血肿的清除手术主要包括: 1. 小骨窗开颅显微镜下血肿的清除术或者是神经内镜下的血肿清除术; 2. 应用框架立体的定向技术或者神经导航下直接与血肿抽吸术来联合软导管血肿进行引流术。

微创手术的入路选择应该靠近病变的部位, 同时还不会对脑的重要功能结构和血管造成损伤, 还应该选择易于残留血肿的引流清除。在原则上应该选择血肿的长轴来作为穿刺入路的方向。1. 小骨窗开颅或者神经内镜进行血肿清除术的方法, 主要的特点有: 开颅段时间较短, 创伤较小; 可以在直视的状态下迅速的清除血肿并且止血, 而血肿的清除也比较彻底; 感染的发生率较低, 并发症的发生情况也比较低, 同时还可以有效的维持颅内压的平稳。但是这种手术方式减压效果不够充分, 并且清除深部的血肿比较困难, 对设备有较高的要求等。2. 框架立体定向术或者神经导航辅助血肿抽吸术, 此种方法可以准确的穿刺抽吸血肿, 并且可以凭借立体定向头架坐标和颅脑的解剖标识来定位血肿进行手术, 可以明显的提高血肿的清除率, 并且减少因过度抽吸而导致的再出血情况, 此种手术方法不仅, 适用于脑深部的血肿, 还适用于多通道置管清除较大的血肿。

脑出血外科治疗的目的是主要是在于及早的清除颅内的血肿, 改善患者的脑部循环, 并且阻断血肿对神经阻滞的继发性损害, 最大限度的促进脑功能的恢复等。而脑出血微创手术较常规的开颅手术, 具有创伤低, 并且清除血肿迅速、安全、可以有效的达到治疗的目的。但是在进行微创手术治疗前, 应该根据患者的出血病因来选择正确的手术方法和手术的时机。

(上接第 95 页)

导其学习丰富的检验学知识, 于检验实施前进行反复多次的训练, 以保证检验效果; 其次是对标本收集的控制; 最后是对血液样本存放温度和控制, 若是放置时间较长, 会导致血液细胞的形态变化更加明显, 从而影响了数据结果的精确度^[2]。此外, 存放环境的温度过高或是过低对检验结果均会造成一定影响, 所以, 在血液细胞检验期间需在常温状态下存放, 以保证稳定的细胞状态, 若是温度变化需采取相应的处理措施^[3]。研究表明, 部分学者对于院内血常规检验的病人指标分析, 血红蛋白、红细胞、白细胞、血小板指标较好的是干预组, 且放置 4 小时后, 对照组的各项数据较差, 指标变化明显, 数据结论与本研究结果一致^[4]。

综上所述, 对临床医学检验血液细胞检验中采取质量控

制的临床效果较好, 降低了检验误差率, 促进临床检验准确度上升, 保证了血液细胞的状态, 提升了血液细胞检验的质量, 在临床上具有重要的研究价值。

〔参考文献〕

- [1] 徐海英. 探析血液细胞检验质量控制中临床医学检验的临床效果[J]. 保健文汇, 2021, 22(5):91-92.
- [2] 范杰轩. 分析检验过程中血液细胞的检验质量控制方法[J]. 家有孕宝, 2021, 3(3):166.
- [3] 李玉明. 临床医学检验中血液细胞检验的质量控制方法研究[J]. 中国医药指南, 2021, 19(8):95-96.
- [4] 刘敏敏. 血液细胞检验质量控制中在临床医学检验中的应用分析[J]. 世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊), 2021, 21(22):236-237.