

神经外科高血压脑出血患者中采用护理干预的效果分析

龚绍玲

昆明市第一人民医院 650000

【摘要】目的 探讨神经外科高血压脑出血患者采用护理干预的应用效果。**方法** 将2020年10月到2021年10月在本院神经外科进行治疗的高血压脑出血的患者60例作为本次的观察对象,并将这60例观察对象随机分为实验组和对照组两组,每组有30例患者,而对照组的36例高血压脑出血的患者采用常规的护理措施进行护理,实验组的30例高血压脑出血的患者采用优质护理措施进行护理,并将两组高血压脑出血患者的治疗有效率以及死亡率和满意度情况进行对比和分析。**结果** 采用优质护理的实验组高血压脑出血的患者治疗有效率以及死亡率和护理工作满意度均优于采用常规护理的对照组患者,且两组患者治疗有效率以及死亡率和满意度对比产生的差异数据具有统计学意义($p < 0.05$)。**结论** 本文对神经外科治疗的高血压脑出血的患者采用优质护理措施进行护理,能够有效的提高患者对护理工作的满意度,同时也能够降低患者的死亡率,提高患者的治疗有效率,在临床上值得推广和使用。

【关键词】 神经外科; 高血压; 脑出血; 优质护理

【中图分类号】 R473

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2022) 04-145-02

在神经外科的脑血管疾病当中,高血压脑出血具有极高的致死率,患者在患有此病以后会出现突然性的发病,同时发病非常的迅速、症状非常的严重、患者也会出现术后不良反应以及并发症等等。但是由于近几年我国不断的发展,所以我国临床的微创技术也在不断的发展,对于高血压脑出血的患者在神经外科主要采取非常先进的手术进行治疗,同时结合有效的护理服务改善患者预后恢复的情况。本文将对外科治疗的高血压脑出血的患者在手术治疗后采用优质护理服务进行护理和分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2020年10月到2021年10月在本院神经外科进行治疗的高血压脑出血的患者60例作为本次的观察对象,并将这60例观察对象随机分为实验组和对照组两组,每组有30例在神经外科进行治疗的高血压脑出血的患者,而对照组的30例在神经外科进行治疗的高血压脑出血的患者中有男性患者17例,女性患者13例,年龄在55~75岁之间,而实验组的30例在神经外科治疗的高血压脑出血的患者中,有男性患者16例,女性患者14例,年龄在56~76岁之间。两组在神经外科治疗的高血压脑出血的患者均符合本次研究的纳入标准,并且两组患者的临床资料对比后产生的差异数据不具有统计学意义($p > 0.05$),具有可比性。

1.2 方法

对照组在神经外科治疗的高血压脑出血的患者采用常规的护理措施进行护理,而实验组的高血压脑出血的患者则是采用优质护理措施进行护理,主要的内容包括:1. 护理人员需要严密的观察患者的瞳孔以及患者的意识,同时还应该掌握患者生命体征的变化,预防患者出现脑水肿以及其他术后再出血的情况。此外,护理人员还应该鼓励患者正确的进行咳嗽,如果患者呼吸道内分泌物堵住患者的呼吸可以给予患者吸痰操作,并且根据患者的血氧检测指数,给予患者低流量的吸氧。2. 加强对患者手术后引流管的工作,护理人员应该及时发现引流管的异常情况,并且对于有渗出现象时及时的进行更换,同时还应该加强对引流管的固定操作,避免引流管受到压迫或者引流管脱落而导致引流不畅的情况。3. 对于意

识清晰但是长期瘫痪而长期卧床的患者进行有效的心理护理,避免患者因长期卧床而出现焦虑、抑郁以及悲观的不良情绪,并且在对患者进行治疗的过程中,鼓励患者、安慰患者、支持患者,提高患者对战胜疾病的信心,同时也提高患者对治疗的依从性以及对护理人员的配合度。4. 加强患者术后的康复训练以及按摩护理,指导患者进行上肢和下肢的康复训练以及语言的康复训练等。护理人员应该根据患者实际病情情况指导患者进行针对性的康复训练,并且训练的强度循序渐进,由轻度训练逐渐变为强度训练,促进患者的健康恢复。

1.3 观察指标

将两组在神经外科治疗的高血压脑出血的患者治疗有效率以及死亡率和护理工作满意度进行对比和分析。

1.4 统计学分析

采用SPSS20.0软件对数据进行处理和分析,计数资料用(n/%)来表示,用 χ^2 进行检验,计量资料用标准差 $\pm$ 来表示,用t进行检验,当 $p < 0.05$ 时具有统计学意义。

2 结果

采用优质护理的实验组在神经外科治疗的高血压脑出血的患者治疗有效率以及死亡率和护理工作满意度均优于对照组的患者,且两组患者的治疗有效率以及死亡率和护理工作满意度对比后产生的差异数据具有统计学意义($p < 0.05$)见表1

表1: 两组患者治疗有效率、死亡率以及满意度的对比情况

组别	治疗有效率	死亡率	护理满意度
对照组	60.00%	30.00%	55.00%
实验组	85.00%	10.00%	90.00%
p	<0.05	<0.05	<0.05

3 讨论

目前在临床上对神经外科治疗的高血压脑出血的患者在治疗的过程中常使用微创手术进行治疗达到有效清除血肿的目的,同时还能减少手术对患者机体产生的创伤,操作也非常简单、手术的时间相对较短,患者在术后伤口愈合的速度也非常的快,同时患者在手术后的并发症发生率比较低等,微创手术对于神经外科治疗的高血压脑出血的患者来说,有

(下转第147页)

造成较大威胁。腹腔镜手术后创伤比较小,术后患者恢复也比较快,因此已经成为结直肠癌主要治疗方法^[4]。腹腔镜手术时加以有效的配合护理,可以提高手术效果,降低术后并发症的发生。若在患者手术治疗的过程中加以护理干预措施,不仅可以有效保证手术的顺利开展,还可以有效巩固患者的临床效果。手术室细节护理实施通过在术前访视中详细进行心理疏导和手术介绍,提升了患者认知^[5]。而术中密切配合和术后积极预防并发症,可保障临床治疗效果和护理质量,提高手术室护理满意度,减少患者手术创伤从而缩短患者住院的时间^[6]。本文通过研究后发现,观察组患者手术时间、术中出血量及住院时间显著优于对照组,观察组患者的护理满意度高于对照组($P < 0.05$)。说明,手术室护理可明显降低腹腔镜结直肠癌根治术后并发症发生率,减少术中出血量,加快患者恢复,提高患者满意度,和谐护患关系。

参考文献:

- [1] 段秀萍,李美,赵子明,等.手术室护理干预应用于腹腔镜结直肠癌根治术中的临床效果分析[J].中国现代医生,2018,56(5):146-148.
- [2] 刘炎,张玉红.手术室护理用于腹腔镜结直肠癌根治

术的临床价值探讨[J].基层医学论坛,2020,24(9):1301-1302.

[3] 李丹,初晓杰,杨凤,等.手术室护理干预应用于腹腔镜结直肠癌根治术中的临床效果[J].临床医药文献电子杂志,2020,7(48):91,113.

[4] 王霞.手术室护理用于腹腔镜结直肠癌根治术中的效果与价值研究[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(34):133.

[5] 高佩.分析手术室护理干预应用于腹腔镜结直肠癌根治术中的临床效果[J].黑龙江医学,2021,45(18):1961-1963.

[6] 董明明.手术室护理用于腹腔镜结直肠癌根治术中的临床效果分析[J].中国医药指南,2018,16(33):219-220.

表2:两组患者护理满意度比较[n(%)]

组别	例数	非常满意	满意	一般	不满意	满意度(%)
观察组	26	20(76.9)	6(23.1)	0(0)	0(0)	100.0
对照组	26	12(46.2)	8(30.8)	5(19.2)	1(3.8)	76.9
χ^2						4.7101
P						<0.05

(上接第143页)

观察组满意度98.18%,对照组满意度87.27%,与对照组相比,观察组满意度更高,差异有统计学意义, $P < 0.05$,见表3。

3 讨论

卵巢肿瘤可发生于任何年龄,是一种常见的女性生殖系统肿瘤,会影响患者的生育功能及身心健康。在该疾病的治疗中,目前以腹腔镜下切除术较为多见,虽然与传统的手术方式相比,腹腔镜手术创伤小,并发症少,患者的接受性高,但是在一定程度上仍然会对患者的身体和心理造成一定的影响,因此患者的术后护理极为重要^[2]。优质护理是一种“以患者为中心”的护理模式,重视患者的人文关怀和护理工作的科学性,更有助于提高患者的配合度和护理工作的开展。

在本次研究中,应用术后优质护理的观察组患者的各项

术后恢复指标明显优于对照组,并且与对照组相比,观察组术后并发症发生率更低,对护理工作满意度更高,这可能与优质护理不仅能够满足患者基本的生活需求和安全需求,还能为患者提供更为细致,科学护理,帮助患者保持心理平衡等因素有关^[3]。

综上所述,优质护理能够促进卵巢肿瘤切除术患者的术后恢复,减少并发症发生,提高满意度。

参考文献:

- [1] 刘芳.对接受腹腔镜下卵巢囊肿切除术后的患者进行优质护理的效果研究[J].当代医药论坛,2020,18(11):208-209.
- [2] 李芳芳,刘雪娇,黄允,等.卵巢肿瘤切除患者术后优质护理的应用价值[J].黑龙江中医药,2022,49(02):194-195.
- [3] 孙艳.优质护理在卵巢囊肿围术期护理中的应用效果[J].中国当代医药,2021,26(33):242-244+253.

(上接第144页)

综上,针对新生儿采取鸟巢式护理干预,新生儿家属满意度显著改善,适于推广与应用。

参考文献:

- [1] 宋娟,董墨林.鸟巢式护理在新生儿护理中的效果分析[J].健康大视野,2019,000(008):160.
- [2] 江观银,张雪琴.鸟巢式护理在新生儿护理中的应用效果及对护理满意度的效果分析[J].实用临床护理学电子杂志,2020,v.5(15):79+94.

志,2020,v.5(15):79+94.

[3] 赵艳,王蕊.鸟巢式护理在新生儿护理中的应用效果观察[J].实用临床护理学电子杂志,2019,004(015):146,148.

[4] 尹小乐.鸟巢式护理模式在早产新生儿护理中的应用效果及对生长状况、疼痛程度和胃肠功能的影响分析[J].实用临床护理学电子杂志2020年5卷26期,136-137页,2020.

[5] 刘芳.探究鸟巢式护理在早产新生儿护理中的应用及可行性研究[J].饮食保健,2020,007(003):128.

(上接第145页)

很多的临床特点,并且治疗的效果也是非常令人满意的,能够提高患者的生活质量。虽然微创手术有很多的特点,如果患者在术后没有得到很好的护理,也会提高患者出现并发症的几率,导致患者出现不良的情绪,影响治疗的效果。

本文将对在神经外科治疗的高血压脑出血的患者采用优质护理措施进行护理,能够有效的改善患者的负面情绪,提高患者对护理工作的满意度以及患者的治疗效果,同时还能够降低患者的死亡率以及并发症的几率,值得使用。

参考文献:

- [1] 韦武腾.微创穿刺抽吸治疗高血压脑出血200例体会[J].中国临床神经外科杂志,2021,9(7):372-373.
- [2] 梁艳群.51例高血压性脑出血术后护理体会[J].当代护士,2021,9(3):17.
- [3] 张红岩.高血压脑出血手术治疗的适应证及其临床护理观察[J].中国卫生产业,2021,28(1):51-53.
- [4] 卫中梅.高血压性脑出血并发症的预防及护理[J].中国实用神经疾病杂志,2021,16(2):107-108.