

优质护理管理在新生儿护理中的应用价值研究

王秀仙

云南省文山州丘北县人民医院 云南丘北 663200

〔摘要〕目的 通过案例分析探讨优质护理方式应用于新生儿的治疗护理效果。方法 选择 2021 年 2 月至 2022 年 2 月期间,前来我院就诊的 88 例新生患儿,将所有病人根据随机分组方法分为参考组与对照组,每组各 44 人。对照组病人开展日常规范化护理方案,参考组开展以对照组为基础,结合优质护理的护理方案,对比两组患儿的治疗效果;对比两组患儿发生不良反应的比例;对比两组患儿护理满意比例及住院时间。结果 护理后,参考组患儿的总有效比例为 95.46%,显著大于对照组的 68.18%,两组之间有着统计学的价值 ($P < 0.05$);参考组患儿发生不良反应的比例为 20.45%,显著小于对照组的 47.73%,两组之间有着统计学的价值 ($P < 0.05$);参考组患儿家长对于护理工作的满意比例为 95.45%,显著大于对照组的 47.73%,参考组住院时间短于对照组,两组之间有着统计学的价值 ($P < 0.05$)。结论 运用优质护理方式于新生儿的护理工作中有着良好的护理效果,不仅能够提高治疗效果,减少不良反应的发生比例,增强护理工作的满意率,减少住院时间,值得临床工作中推广。

〔关键词〕优质护理管理;新生儿;护理干预;应用价值

〔中图分类号〕R473.72

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕2095-7165 (2022) 06-134-02

新生儿就是指孕妇在分娩后 28 日内的婴儿。针对新生儿而言,他们属于对外部抵抗能力较弱的特殊人群,由于身体内的各个脏器发育尚未完全,免疫能力较低。同时,一些新生儿需要面对新陈代谢出现异常和遗传性疾病的威胁,非常容易引发不良病症。因而,加强护理对新生儿健康成长有着重要的价值^[1]。近些年,在我国的医疗水平不断提升,在这样的情况下,传统护理方式也在不断完善和提升,护理逐渐从传统模式向更全方位、更专业化的高品质护理方式转变^[2]。所说的优质护理模式,就是临床护理工作人员将护理规范要求与护理经验紧密结合,从多个方面为病人提供高品质的护理服务。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选择 2021 年 2 月至 2022 年 2 月期间,前来我院就诊的 88 例新生患儿,将所有病人根据随机分组方法分为参考组与对照组,每组各 44 人。其中:对照组病人中男婴占 25 人,女婴占 19 人,年龄处于 30 周至 28 天,实施剖宫产手术的占 20 人,实施自然分娩的占 24 人。对照组病人中男婴占 27 人,女婴占 17 人,年龄处于 32 周至 29 天,实施剖宫产手术的占 19 人,实施自然分娩的占 25 人。两组病人在性别、年龄、生产方式等基本情况相近,没有医学上的显著差异 ($P > 0.05$),有着可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组病人开展日常规范化护理方案

主要内容包括:密切关注患儿的各项指标,掌握患儿的喂养情况,观察大小便等情况。

1.2.2 参考组开展以对照组为基础,结合优质护理的护理方案

(1) 体位护理。新生儿安置中应用舒适毛巾采用鸟巢状包裹,对新生儿包裹中要保持合理的体位,确保手能够触及到面部,利用头手互动。(2) 皮肤护理。护理人员为新生儿佩戴手套脚套防止抓伤,处于暖箱及光疗箱内的患儿在头部加入舒适软枕^[3]。保证室内温度和湿度处于最佳状态,防止

发生闷热或出疹。(3) 抚触护理。在条件允许下,播放轻柔音乐时进行抚触,以改善食欲和睡眠质量,促进体重增加,降低发生并发症比例。(4) 日常护理。在日常生活中开展不良症状防治工作,密切关注患儿的生理状态和相关指标,方便对病情的掌握和判断^[4]。(5) 健康教育。对母亲开展喂养技巧、日常护理等相关知识宣讲,指导产妇开展合理的饮食,促进产妇身体恢复和母乳的品质。

1.3 观察指标

观察对比两组患儿的治疗效果;观察对比两组患儿发生不良反应的比例;观察对比两组患儿护理满意比例及住院时间。

1.4 统计学方法

对于研究的基本内容运用统计学中较为标准的数据计算分析专用软件 (spss23.0 版本),开展对相关数据分析处理,将测量信息以 ($\bar{x} \pm s$) 表示,选择 t 检验。计数信息以 (%) 表示,采用卡方检验, $P < 0.05$ 表明有着统计学价值。

2 结果

2.1 对比两组患儿在采用不同的护理方案后的治疗效果

护理后,参考组患儿的总有效比例为 95.46%,显著大于对照组的 68.18%,两组之间有着统计学的价值 ($P < 0.05$),详见表 1。

表 1 对比两组患儿在采用不同的护理方案后的治疗效果

(n, %)					
组别	例数	显效	有效	无效	总有效率
对照组	44	18 (40.91)	12 (27.27)	14 (31.82)	30 (68.18)
参考组	44	25 (56.82)	17 (38.64)	2 (4.54)	42 (95.46)
χ^2 值	-	-	-	-	4.032
P 值	-	-	-	-	< 0.05

2.2 对比两组患儿在采用不同的护理方案后发生不良反应的比例

护理后,参考组患儿发生不良反应的比例为 20.45%,显著小于对照组的 47.73%,两组之间有着统计学的价值 ($P < 0.05$),详见表 2。

2.3 对比两组患儿在采用不同的护理方案后护理满意比例

及住院时间

护理后, 参考组患儿家长对于护理工作的满意比例为 95.45%, 显著大于对照组的 47.73%, 参考组住院时间短于对照组, 两组之间有着统计学的价值 ($P < 0.05$), 详见表 3。

表 2 对比两组患儿在采用不同的护理方案后发生不良反应的比例 (n, %)

组别	例数	皮肤感染	高胆红素血症	红疹	总发生率 %
对照组	44	7 (15.91)	10 (22.73)	4 (9.09)	21 (47.73)
参考组	44	4 (9.09)	4 (9.09)	1 (2.27)	9 (20.45)
χ^2 值	-	-	-	-	4.482
P 值	-	-	-	-	< 0.05

表 3 对比两组患儿在采用不同的护理方案后护理满意比例及住院时间

组别	例数	护理满意度	住院时间
对照组	44	34 (77.27)	14.10 ± 2.2
参考组	44	43 (95.45)	9.02 ± 2.2
t/ χ^2 值	-	5.081	12.507
P 值	-	< 0.05	< 0.05

3 讨论

在医院的就诊病人中新生儿属于较为特殊的人群。新生儿出生后因自身的抵抗力较弱, 无法抵御外界影响, 适应外部环境因素, 在这样的情况下, 很容易发生各种不良反应, 因而针对新生儿开展优质护理服务对于保障患儿的健康成长有着积极的意义^[6]。对护理人员而言, 新生儿是住院期内接触较多的诊疗人群, 在患儿住院期内要认真观察有关情况, 对患儿出现的各种不良反应实施治疗护理措施, 保证儿童得到更高质量的护理服务^[6]。在本次研究中显示, 参考组患儿

的总有效比例为 95.46%, 显著大于对照组的 68.18%, 两组之间有着统计学的价值 ($P < 0.05$); 参考组患儿发生不良反应的比例为 20.45%, 显著小于对照组的 47.73%, 两组之间有着统计学的价值 ($P < 0.05$); 参考组患儿家长对于护理工作的满意比例为 95.45%, 显著大于对照组的 47.73%, 参考组住院时间短于对照组, 两组之间有着统计学的价值 ($P < 0.05$)。参照组患儿运用了优质护理管理, 其临床治疗效果显著提升, 乃至患儿发生不良反应的比例也有一定的改进, 住院周期减少, 与此同时, 通过与家人开展沟通交流, 得到了家人的支持和配合, 使护理工作顺利开展, 不仅改进了护患关系, 还提升了护理满意度。

综上所述, 在临床治疗新生儿时, 运用优质护理服务管理方法有着较好的效果, 不仅能够减少住院时间, 改进病人发生的不良反应, 因而这一护理方式有着临床应用和借鉴价值。

[参考文献]

- [1] 职晨阳, 许斯, 王敏. 优质护理管理在新生儿护理中的应用效果分析 [J]. 全科口腔医学电子杂志, 2019, 6(26):149-153.
- [2] 练素斌, 王丹莹. 全面优质护理服务在新生儿坏死性小肠结肠炎中的应用价值 [J]. 中外医学研究, 2019, 17(29):100-102.
- [3] 张艳. 鸟巢式护理在新生儿惊厥中的试验研究 [J]. 实用临床护理学电子杂志, 2019, 4(22):133.
- [4] 傅雅莉. 优质护理管理在新生儿护理中的应用效果研究 [J]. 全科口腔医学电子杂志, 2019, 6(27):102.
- [5] 喻红君. 抚触保健护理对新生儿体格发育、胆红素水平的改善作用评价 [J]. 饮食保健, 2019, 6(12):148.
- [6] 职晨阳, 许斯, 王敏. 优质护理管理在新生儿护理中的应用效果分析 [J]. 全科口腔医学电子杂志, 2019, 6(26):149-153.

(上接第 132 页)

室继续对症治疗, 转移过程中为危重症患者实施的 PDCA 循环管理模式, 弥补了传统管理模式存在的缺陷, 对于护理质量进行优化控制。为危重症患者联合开展护理风险管理, 在院内转移期间保障护理实施患者安全性, 提升护理人员识别和处理转移中存在潜在风险的能力, 优化风险管理意识。

比较两组急诊科危重患者院内转移中的护理质量评分, 实验组均高于对照组, $P < 0.05$; 比较两组患者院内转移后不良事件发生率, 实验组低于对照组, $P < 0.05$ 。

综上所述, 急诊科危重患者院内转移中, 实施应用护理风险管理和 PDCA 管理, 促使实施护理措施优质化改善, 保障患者安全性。

[参考文献]

- [1] 路俊英. 护理风险管理在急诊危重患者护送中的应用研究 [J]. 中国社区医师, 2022, 38(12):149-151.

(上接第 133 页)

晕血史了解, 注意力转移、按压事项告知措施, 能够较好的保障患者静脉采血期间安全性, 对一系列不良反应事件的预防性较好, 可提高采血质量^[5]。

总而言之, 对静脉采血患者行整体护理, 价值显著; 一方面, 有利于减少其头晕、疼痛、瘀血、静脉炎等不良反应发生率; 另一方面, 能够有效提高患者满意程度, 值得推荐。

[参考文献]

- [1] 孟珊, 谢博. 优质护理在对健康体检者静脉采血中的应用价值分析 [J]. 西藏医药, 2019, 40(01):129-130.

- [2] 王雪松, 王恽梅. 护理风险管理在急诊危重患者院内转移过程中的效果评价 [J]. 基层医学论坛, 2020, 24(36):5272-5273.

- [3] 安玲玲. 整体性护理管理模式在急诊科危重患者抢救中的应用评估 [J]. 黑龙江中医药, 2020, 49(05):132-133.

- [4] 方娣回, 焦爱林. 无缝隙护理导向型急诊科危重患者护理管理对其的焦虑情绪改善作用分析 [J]. 中国卫生产业, 2020, 17(10):61-62+65.

- [5] 王琴. 整体性护理管理模式在急诊科危重患者抢救中的应用分析 [J]. 中国医药科学, 2020, 10(03):227-229+247.

表 2 院内转移后不良事件比较 (n, %)

组别	例数	意外发生	转移死亡	护理纠纷
实验组	42	1 (3.38)	0 (0.00)	0 (0.00)
对照组	42	6 (14.29)	4 (9.52)	5 (11.90)
χ^2	--	3.89	4.20	5.31
P	--	0.04	0.04	0.02

- [2] 秦燕, 樊秀娟. 护理管理干预在静脉输液中的应用效果及对安全性的影响 [J]. 临床医学研究与实践, 2020, 5(17):182-184.

- [3] 农良萍, 黄桂航, 李紫霞, 等. 穴位按摩结合情志干预对门诊静脉采血患者心理状况的影响 [J]. 心理月刊, 2020, 15(13):49-49.

- [4] 张静. 体检者应用护理干预对静脉采血疼痛的缓解效果研究 [J]. 人人健康, 2020, 513(04):184-185.

- [5] 龙世霞, 黄建兰, 梁成富. 护理干预对小儿静脉采血前后疼痛的影响效果分析 [J]. 现代养生, 2019, 355(18):192-193.