

亲情护理在完全植入式静脉输液港乳腺癌化疗患者护理中的应用评价

秦雅筑 景良洪^{通讯作者}

重庆市人民医院乳腺甲状腺外科 401147

【摘要】目的 分析完全植入式静脉输液港乳腺癌患者化疗阶段, 落实亲情护理的应用效果。**方法** 样本选择接受完全植入式静脉输液港的乳腺癌化疗患者, 调研时间现在为 2022 年 1 月到 2022 年 12 月, 将收录的 100 例患者分为对照组与干预组, 评价亲情护理措施的应用效果。**结果** 通过满意度数据分析, 充分证实新型护理措施的开展, 能有效帮助乳腺癌化疗患者改善医疗阶段的情绪状态, 使得患者病情认知与依从行为有效提升, 显著优化患者的病理护理满意度 ($P < 0.05$); 情绪状态评分充分证实亲情护理措施, 能进一步强化乳腺癌化疗干预阶段患者的情绪状态, 有效缓解焦虑抑郁等不良情绪, 优化患者的预后质量 ($P < 0.05$)。**结论** 亲情护理措施的开展使得完全植入式静脉输液港乳腺癌患者化疗阶段的依存行为与认知程度进一步提升, 优化整体的医疗干预效率, 提升预后生活质量。

【关键词】 亲情护理; 完全植入式静脉输液港; 乳腺癌化疗患者; 护理价值

【中图分类号】 R473.73

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2023) 03-104-02

乳腺癌医疗关于这种化疗为主要的治疗方案之一, 虽然疗效显著的化疗药物也会损伤正常生理组织; 长期给药还会刺激血管, 诱发静脉炎症。为了更好地优化患者医疗干预阶段的身心状态; 落实有效且全面的护理服务势在必行^[1-2]。本次医学调研评价亲情护理措施, 在乳腺癌患者化疗阶段的应用效果, 详见下文。

1 资料与方法

1.1 一般资料

样本选择接受完全植入式静脉输液港的乳腺癌化疗患者, 调研时间现在为 2022 年 1 月到 2022 年 12 月, 将收录的 100 例患者分为对照组与干预组, 资料分析中, 男女比例为 20:30 与 23:27; 平均年龄为 48.79 ± 6.66 岁与 48.39 ± 2.47 岁; 基本资料平衡, 调研数据可比。

1.2 方法

对照组患者病情护理阶段开展常规护理服务; 相关护理内容主要包括日常用药, 疼痛护理以及饮食干预等基础措施。

干预组患者开展亲情护理服务; 首先联合患者家属组建亲情护理小组; 和患者家属共同学习亲情护理理念以及相关护理措施的落实内容, 强化亲情护理意识, 有效落实各项护理措施。由于乳腺癌患者病理, 影响极易产生焦虑, 自卑, 抑郁等不良情绪, 需联合患者家属开展疏导与交流干预措施; 帮助患者有效缓解负性情绪, 改善日常行为与情绪状态, 使得患者康复信心与依存行为有效强化。环境护理干预方面; 尽量维持病房的卫生, 保证病房温度湿度处于适宜状态, 定期通风以优化空气质量; 基于环境状态放置绿植来提高病房的温馨程度。健康性教育方面, 耐心向患者讲解乳腺癌的相关知识, 使其明确乳腺癌的危险因素, 临床症状表现医疗干

预效果以及日常生活中的注意事项; 基于乳腺癌化疗后的不良反应进行讲解, 使得患者明确治疗阶段的并发症发生类型, 能够做好预防措施, 优化患者的预后质量^[3-4]。

1.3 评判标准

评价乳腺癌化疗患者对医疗护理服务的满意度。

分析化疗患者医疗阶段的焦虑情绪与抑郁情绪。

1.4 统计学意义

以 SPSS27.0 对数据进行统计分析, 计量资料用格式统一为 ($\bar{x} \pm s$)、计数资料格式他统一为 (n, %), t、 χ^2 检验。统计值有统计学差异的判定标准为 $P < 0.05$ 。

2 结果

2.1 满意度对比

通过满意度数据分析, 充分证实新型护理措施的开展, 能有效帮助乳腺癌化疗患者改善医疗阶段的情绪状态, 使得患者病情认知与依从行为有效提升, 显著优化患者的病理护理满意度 ($P < 0.05$), 详见表 1。

表 1: 满意度对比 (n, %)

组别	例数	非常满意	满意	不满意	满意度
对照组	50	11	32	7	86.00
干预组	50	16	33	1	98.00
χ^2	-	-	-	-	4.8913
P	-	-	-	-	0.0270

2.2 情绪评价分析

情绪状态评分充分证实亲情护理措施, 能进一步强化乳腺癌化疗干预阶段患者的情绪状态, 有效缓解焦虑抑郁等不良情绪, 优化患者的预后质量 ($P < 0.05$), 详见表 2。

表 2: 情绪评价分析 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	GAD-7		PHQ-9	
		干预前	干预后	干预前	干预后
对照组	50	15.52 ± 1.45	12.36 ± 1.25	16.33 ± 1.56	12.85 ± 1.23
干预组	50	15.46 ± 1.49	10.61 ± 1.03	16.29 ± 1.57	10.02 ± 1.09
T	-	0.2041	7.6400	0.1278	12.1761
P	-	0.8387	0.0000	0.8986	0.0000

3 讨论

(下转第 106 页)

注：两组护理前对比， $p>0.05$ ，两组护理后对比， $p<0.05$ 。

如表1所示，综合组空腹血糖与餐后2h血糖水平上，护理后降低程度明显多于基础组（ $p<0.05$ ）。

2.2 患者并发症发生率情况

见表2所示，综合组并发症发生率为4.88%，基础组26.83%（ $p<0.05$ ）。

表2：患者并发症发生率评估结果 [n(%)]

分组	n	脑水肿	急性肾损伤	低血糖	低血钾	并发症发生率
综合组	41	0	0	1	1	4.88%
基础组	41	1	1	5	4	26.83%

注：两组对比， $p<0.05$ 。

3 讨论

对家属的处理也是重要的一部分，家属应该给予患者充分的关注和支持，帮助患者应对病情和治疗。护士应该与家属进行沟通，向他们介绍患者的病情和治疗方案，解答他们的疑问，同时告诉他们如何在日常生活中给予患者帮助和照顾。

（上接第103页）

正确使用药物，遵守治疗计划，提高治疗效果。可以预防感染，艾滋病的传播途径有多种，护理人员可以通过有效的隔离措施和感染控制措施，预防艾滋病的传播和感染。可以缓解患者心理负担：艾滋病是一种严重的疾病，患者需要面对诸多困难和挑战，护理人员可以通过心理护理和支持，缓解患者心理负担，提高其生活质量。能够加强健康教育：艾滋病的预防和治疗需要患者理解和积极配合，护理人员可以向患者提供专业的健康教育，帮助患者了解疾病，正确对待和应对疾病。

总而言之，艾滋病患者中运用急诊科护理干预后，可以有效的提升患者治疗依从性，优化患者护理满意度，整体状况更好。

（上接第104页）

近年来乳腺癌有年轻化发展趋势，通过化疗干预方案，能有效抑制癌细胞增殖增生；但化疗药物的使用会导致静脉通道受到影响；同时由于病理影响，乳腺癌患者生理状态与心理状态将会发生改变，所以在病情干预阶段落实高质量的护理服务，能最大程度优化患者的身心状态。亲情护理措施的开展，基于亲情护理理念为指导，使患者获得精神上的支持与心理上的慰藉；通过清洁护理措施开展帮助患者缓解不良情绪，强化依从行为，提升治疗信心，使得生活满足感与生活幸福感进一步提升，有效配合医疗干预，改善预后生活质量^[5]。通过满意度数据分析，充分证实新型护理措施的开展，能有效帮助乳腺癌化疗患者改善医疗阶段的情绪状态，使得患者病情认知与依从行为有效提升，显著优化患者的病理护理满意度；情绪状态评分充分证实亲情护理措施，能进一步强化乳腺癌化疗干预阶段患者的情绪状态，有效缓解焦虑抑郁等不良情绪，优化患者的预后质量；相关研究结果均证实亲情护理措施可进一步优化乳腺癌化疗患者病情干预效率，显著提升整体的医疗干预治疗。

顾，如饮食控制、药物管理等方面。此外，护士还应该关注家属的心理状态，及时发现并解决可能出现的心理问题，提供必要的心理支持和帮助。

总而言之，急诊糖尿病酮症酸中毒患者中运用综合护理干预，可以有效的降低患者血糖水平，减少并发症的发生率，整体效果与安全性更高。

参考文献：

- [1] 张丽月，陈丽美. 急诊糖尿病酮症酸中毒患儿中应用综合护理的效果研究 [J]. 糖尿病新世界，2022，25(19):134-137.
- [2] 林月娇，郑燕清，黄幼凤. 急救护理干预方案对急诊糖尿病酮症酸中毒患者的临床效果及有效率影响 [J]. 糖尿病新世界，2022，25(20):21-24，28.
- [3] 林苏，颖颖，林晶晶. 急救护理对急诊糖尿病酮症酸中毒患者的临床疗效及有效率分析 [J]. 糖尿病新世界，2022，24(5):112-115.
- [4] 俞尾秀. 急诊综合护理在糖尿病酮症酸中毒患者中的效果及低血糖发生率影响分析 [J]. 糖尿病新世界，2022，25(3):158-161.

参考文献：

- [1] 袁雯，李雪梅，刘锦峰. 基于自我调节理论的护理干预对艾滋病患者疾病感知能力及遵医用药依从性的影响 [J]. 中国性科学，2023，32(1):137-141.
- [2] 周志慧，孙秋兰，吴桂香. 知-信-行护理干预对初治艾滋病患者耻辱感的影响 [J]. 中西医结合护理（中英文），2022，8(8):38-41.
- [3] 陈霞，李金红. 叙事护理策略对艾滋病合并肺炎孢子菌肺炎患者负面情绪的影响 [J]. 医药高职教育与现代护理，2022，5(4):328-331.
- [4] 司忆，刘春礼. 知-信-行护理干预模式对艾滋病住院患者心理状态及自我管理能力的的影响 [J]. 护理实践与研究，2021，18(24):3705-3709.

综上所述，落实亲情护理措施能有效改善完全置入静脉输液港乳腺癌化疗患者的医疗干预效率，使得患者依从行为与认知程度进一步优化，有推广价值。

参考文献：

- [1] 张红梅，魏凤梅，凌迪 del. 分析乳腺癌患者植入式中心静脉输液港护理中优质护理的应用 [J]. 健康大视野，2021，000(013):145-146.
- [2] 幸素芳，晏晴. 优质护理理念在乳腺癌患者植入式中心静脉输液港护理中的应用效果分析 [J]. 家有孕宝，2021，3(3):268-268.
- [3] 丛波，丛春廷. 优质护理在乳腺癌病人植入式中心静脉输液港护理中的价值体会 [J]. 糖尿病天地，2021，18(2):231-231.
- [4] 潘胜娜，孟雅，黄学芳. 分析乳腺癌患者植入式中心静脉输液港护理中优质护理的应用 [J]. 中国科技期刊数据库医药，2022，7(7):79-81.
- [5] 陈伟，夏旭霞，章月照. 全程规范化护理体系对乳腺癌植入式静脉输液港化疗患者不良反应的影响 [J]. 中国性科学，2022，31(1):98-101.