

消毒供应中心护理质量控制对预防院内感染的效果

范 艳

丰县人民医院消毒供应中心 江苏徐州 221700

【摘要】目的 分析研究消毒供应中心护理质量控制对预防院内感染的应用价值。方法 本院选取 20 例消毒供应中心工作人员分析,研究时间起始点范围:2018.12-2021.12,利用随机数字表法划分为对照组(常规护理、10 例)、观察组(护理质量控制、10 例),统计各项指标(护理满意度、护理管理质量)分析。结果 在护理满意度项目中,观察组研究结果呈现出升高趋势,且实际数据高于对照组, $P < 0.05$ 。在护理管理质量项目中,观察组研究结果呈现出升高趋势,且实际数据高于对照组, $P < 0.05$ 。结论 在消毒供应中心护理期间通过予以护理质量控制方法,具有提高护理满意度及护理管理质量的效果,很大程度上提高了护理水平,在临床中具有借鉴及应用推广价值。

【关键词】院内感染;护理质量控制;消毒供应中心;护理满意度;应用价值

【中图分类号】R473

【文献标识码】A

【文章编号】2095-9753 (2023) 05-101-02

在医院中,消毒供应中心是特殊且重要的科室,需做好各项护理工作,避免出现院内感染现象^[1]。在实际的管理过程中采取护理质量控制方法,减少不良因素的影响,从而保证消毒供应中心工作质量,进一步提高其医疗水平。本文选取消毒供应中心工作(时段:2018.12-2021.12)分析,观察组护理质量控制的应用价值。

1 资料和方法

1.1 一般资料

本次研究中,选取消毒供应中心工作人员分析,本次研究一共选择 20 例,研究时间起始点范围:2018.12-2021.12。其中,观察组 10 例男性人数、女性人数比重为 3:7,年龄所在主要范围下限值、上限值为 25 岁、41 岁,平均(33.41±3.21)岁。对照组 10 例男性人数、女性人数比重为 2:8,年龄所在主要范围下限值、上限值为 27 岁、40 岁,平均(33.52±3.15)岁。两组自然信息无差异($P > 0.05$)。

1.2 方法

对照组常规护理,根据消毒供应中心相关标准展开基础护理。观察组护理质量控制,(1)加强人员培训:评估消毒供应中心的实际情况定期开展培训,内容包括:实践操作、专业技能及思想理念等,提高其院内感染预防意识,提高自身责任感,并强化其质量管理意识。(2)加强健康教育:通过发放健康手册或者定期开展讲座的方式进行宣教,提供学习交流机会,积极传播消毒供应中心感染预防知识,明确器械结构及清洗保养方法,将其专业素质提升。(3)合理开展

消毒:护理人员以院内消毒隔离制度作为基础开展消毒工作,避免出现污染现象,有效控制院内感染。同时制定高压灭菌器维修制度,提高其工作积极性和主动性,将整体护理质量提升。(4)加强灭菌监测:护理人员一旦发现异常情况及时上报并处理,保证各项工作顺利实施。对工作情况定期评估,以评估结果作为基础制定改进措施,有效减少院内感染现象,保证其生命安全。

1.3 观察指标

①两组护理满意度对比^[2]。②两组护理管理质量对比^[3]。

1.4 统计学方法

SPSS20.0,计量资料(涵盖护理管理质量研究结果)表示: $(\bar{x} \pm s)$, t 检验,计数资料(涵盖护理满意度研究结果)表示: $n, \%$, χ^2 检验, $P < 0.05$,差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组护理满意度对比

观察组高于对照组, $P < 0.05$ 。表 1: 两组护理满意度对比 [$n/(\%)$]

组别	满意	基本满意	不满意	满意度(%)
对照组 ($n=10$)	2 (20.00)	2 (20.00)	6 (60.00)	4 (40.00)
观察组 ($n=10$)	5 (50.00)	4 (40.00)	1 (10.00)	9 (90.00)
χ^2	----	----	----	5.494
P	----	----	----	0.019

2.2 两组护理管理质量对比

观察组高于对照组, $P < 0.05$ 。表 2: 两组护理管理质量对比 ($\bar{x} \pm s$)

组别	安全管理(分)	无菌区管理(分)	包装区管理(分)	污染区管理(分)	环境管理(分)	物品管理(分)
对照组 ($n=10$)	90.52±2.41	92.05±1.55	91.92±2.02	85.91±3.14	92.52±2.82	92.14±2.02
观察组 ($n=10$)	94.15±2.52	95.57±3.52	95.31±1.54	90.52±3.15	95.92±1.05	95.91±1.25
t	3.301	2.944	4.120	3.272	3.457	5.018
P	0.004	0.008	0.000	0.004	0.002	0.000

3 讨论

消毒供应中心工作比较琐碎和复杂,需遵从无菌操作原则。在实际的感染控制过程中,相关管理人员应该将消毒供应中心护理流程不断改善和优化,保持管理工作规范性和科学性^[4]。在实际管理期间,科学改造消毒供应中心,及时更新灭菌设备和物品,定期检查消毒供应中心工作质量,病情对设备进行维护,开展积极有效的护理质量控制工作,对其

疗效提升、预后改善具有非常重要的作用^[5]。

研究发现,在护理满意度项目中,观察组研究结果呈现出升高趋势,且实际数据高于对照组, $P < 0.05$ 。在实际护理工作中采取护理质量控制方法可获得满意的护理效果。相关护理人员积极评价院内感染预防效果,为消毒供应中心工作夯实基础。同时统计分析院内感染情况,通过全面系统护

(下转第 103 页)

做好各项护理工作,确保治疗成功。术后落实医嘱护理,强化病情观察和对症支持护理,确保引流通畅,促使患者病情好转,提高生活质量,让患者更满意^[5]。

综上所述,在前列腺增生症患者中,进行围手术期综合护理,效果更好。

参考文献:

- [1] 张凤.经尿道前列腺电切术治疗前列腺增生症的围手术期护理的临床价值研究[J].中国医药指南,2022,20(10):127-129.
- [2] 高颖,龙玲.前列腺微波治疗仪联合综合护理在行腹腔镜下经尿道前列腺电切术患者围手术期中的应用[J].医疗装

备,2021,34(18):157-158.

[3] 曾春风.围手术期护理对于经尿道前列腺电切术治疗前列腺增生症患者的临床影响分析[J].黑龙江医药,2021,34(01):223-225.

[4] 刘天书.经尿道前列腺电切术治疗前列腺增生症患者的围手术期综合护理效果观察[J].中国医药指南,2020,18(19):170-172.

[5] 马菊.探讨前列腺增生实施经尿道前列腺等离子电切术的患者采用围手术期护理的效果[J].黑龙江中医药,2020,49(02):232-233.

表3:研究护理满意率

组别	患者(例)	非常满意(例/%)	一般满意(例/%)	不满意(例/%)	非常不满意(例/%)	护理满意率(例/%)
参照组	35	17/48.57	9/25.71	3/8.57	5/14.28	25/71.42
围手术期综合护理组	35	23/65.71	10/28.57	1/2.85	1/2.85	33/94.28
χ^2 值		--	--	--	--	5.2851
P 值		--	--	--	--	0.0215

(上接第99页)

随着我国对基层医院的大力支持和医生的培训,社区卫生服务中心可以进行简单的人流手术或清创手术。人流手术患者对手术治疗会产生极大的恐惧情绪,从而会形成不良情绪,通过心理护理干预有利于改善患者预后,保证患者的生活质量^[4]。通过心理护理有效安抚患者的不良情绪,患者对人流手术治疗有更全面的理解,也能积极的配合治疗的开展。综上所述,为社区卫生服务中心采取人流患者实施心理护理干预,有效安抚患者的不良情绪,也能改善患者术后疼痛,保证手术治疗效果来为患者机体康复提供保障。

参考文献:

- [1] 许瑜珊.无痛人流手术配合系统性心理护理服务体会[J].临床医药文献电子杂志,2020,7(53):72-73.

[2] 马春生.浅析心理护理在无痛人流手术中的作用[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(53):313.

[3] 杜秀琴.探讨心理护理干预对无痛人流手术患者的影响[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(79):227+232.

[4] 王银玲.心理护理对人工流产手术患者应激状态的影响分析[J].中国民间疗法,2018,26(07):104-105.

表3:护理满意度对比

组别	例数	非常满意	满意	不满意	满意度(%)
实验组	45	35	8	1	44(97.78%)
对照组	45	30	5	10	35(77.78%)
χ^2					16.885
P					<0.05

(上接第100页)

上、心理上和生理上给予患者安慰,且能根据患者的行为为其制定合理的护理计划,改善患者不良生活习惯,使患者的生活更健康,饮食更合理,作息更规律。精细护理路径制定的护理路径表格贯穿患者治疗始终,使护理内容更科学、更详细,也能根据患者的病情变化适当调整,高质量的服务能促使患者心理情绪缓解,身体加快恢复,行为更健康^[4]。

综上所述,精细护理路径应用于急性胃炎患者效果显著,能促使患者迅速恢复,缩短住院时间,提高健康行为。

参考文献:

[1] 韩新丽.Orem 干预模式对急性胃炎患者遵医行为及自我效能感的影响[J].承德医学院学报,2022,39(03):224-226.

[2] 黄秀梅,林琴,洪丽溶.延续性护理干预模式在2型糖尿病合并急性胃炎患者中对护理满意度及血糖的影响[J].糖尿病新世界,2021,24(24):128-130+198.

[3] 陈银燕.延续性护理干预模式在2型糖尿病合并急性胃炎患者中的应用效果及生活质量影响[J].糖尿病新世界,2021,24(24):139-142.

[4] 周默.基于加速康复理念的综合护理在急性胃炎患者中的效果[J].中国实用医药,2021,16(27):185-188.

(上接第101页)

理质量控制方法,进一步提高其护理满意度。在护理管理质量项目中,观察组研究结果呈现出升高趋势,且实际数据高于对照组, $P < 0.05$ 。在整个护理期间通过护理质量控制的规范实施可促进护理管理质量提升。在实际护理期间,护理人员提高对专业培训的重视程度,有效提升自身业务水平,熟悉掌握消毒知识和院内感染知识,从而提高整体护理管理质量。

综上所述,随着护理质量控制的有效实施具有明显优势,消毒供应中心护理满意度和护理管理质量显著提升,具有极大的应用推广价值。

参考文献:

[1] 倪燕芳,林培臻,黄洁英,等.全程质量控制与职业防护在消毒供应中心管理再生医疗器械中应用研究[J].基层医学论坛,2022,26(21):105-107.

[2] 郑东秀.消毒供应中心器械消毒灭菌处理中质量控制管理的应用分析[J].中国卫生产业,2022,19(1):69-72.

[3] 王海燕,佟海青.质量控制管理在消毒供应中心管理工作中的应用[J].齐鲁护理杂志,2021,27(22):175-176.

[4] 闫快快,杜洁,周茵,等.PDCA 循环管理模式在消毒供应中心质量控制中的应用效果[J].河南医学研究,2022,31(16):2994-2997.

[5] 谢娟.消毒供应中心实施全程质量控制管理对医院感染的干预效果[J].中国医疗器械信息,2022,28(17):162-164.