

护理安全在眼科护理管理中的应用分析

董蕊 岳湘君

新疆四七四医院眼科中心（原解放军第四七四医院眼科） 乌鲁木齐 830011

【摘要】目的 探究在眼科护理管理中运用护理安全的效果。**方法** 研究时间与截止时间分别为2021年8月、2022年10月，从本院眼科收治的患者中选择80例，用随机数表法分2组，各40例，对照组：常规护理，试验组：护理安全，比较护理情况。**结果** 不良事件发生率相比，试验组少于对照组， $P < 0.05$ ；护理质量评分相比，试验组高于对照组， $P < 0.05$ 。**结论** 在眼科护理管理中，护理安全的应用，可以减少不良事件的发生，对提高护理质量具有积极作用，值得推荐。

【关键词】 眼科；护理管理；护理安全；不良事件发生率；护理质量

【中图分类号】 R473.77

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2023) 05-106-02

通常情况下，眼科收治的患者均为视力障碍者，此时患者易出现不良事件，如坠床、跌倒等，故在眼科的护理管理中，配合有效的护理安全措施非常有必要^[1]。护理安全管理的开展，不仅可以保证患者机体的健康，还可能保证其心理健康。近年来，在我国医疗技术水平的不断提升下，人们对护理质量的要求也越来越高，不仅要求为患者提供较好的基础护理，还要保证护理的舒适性、安全性^[2]。因此，在眼科护理管理中，配合护理安全措施非常有必要。本文探究了在眼科护理管理中运用护理安全的效果，报道如下：

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究时间与截止时间分别为2021年8月、2022年10月，从本院眼科收治的患者中选择80例，用随机数表法分2组，各40例。对照组：男性/女性：23/17，年龄40~77岁，平均 $(\bar{x} \pm s)$ 58.23 $\pm$ 4.38岁；试验组：男性/女性：24/16，年龄41~78岁，平均 $(\bar{x} \pm s)$ 59.13 $\pm$ 4.44岁。上述资料，组间差异小， $P > 0.05$ 。

纳入标准：依从性较高者；精神状态正常者；自愿参与，并在同意书上签字者。

排除标准：依从性不佳者；中途退出研究者；有交流或是沟通障碍者；精神障碍性疾病者。

1.2 方法

对照组采纳常规护理，即向患者介绍医护人员，介绍医院的环境、入院须知，保持整洁、安静、舒适的病房环境。遵医嘱做好分级护理，严格执行药物治疗护理，对患者的病情变化做好密切的观察，如有异常，立即上报医生。做好消毒、隔离措施，预防交叉感染的出现；指导患者规律的生活习惯，同时指导滴眼液的用法，强化药物用量方法与注意事项的管理措施。

基于此，试验组采用护理安全措施，如下：（1）为了保证用药的安全性，强化药物安全护理非常有必要，即在药品上标准确药物的使用时间，分类放置药物，如发现在用药过程中出现配伍禁忌，需要及时上报医生，并对其进行妥善处理。向患者、家属讲解用药方式、剂量与注意事项，定时查对药物，并以其有效期为依据，严格按顺序摆放药品，应用新药时，先解读其说明书。（2）建立规范的的安全管理制度，以医院的实际情况为依据，完善护理安全管理制度，对存在的护理问题进行总结，深入性分析原因；完善病房的护理流程，保证患者可以享受到安全有效的护理服务。科室建立不安全

隐患记录本，每个护理人员均需要排查护理中的危险因素，并将其记录在册。做好并发症的预防护理，定时组织护理人员讨论与总结护理中的问题，并制定相应的改正制度。（3）为护理人员建立工作档案，记录护理工作的成绩，让其可以保持以人为本的护理原则，重视护理安全性。在护理操作中，严格执行护理安全规章制度，加强学习及沟通知识，提高自身综合素质；定时请专业人员到院做培训，加强护理人员安全护理的意识。

1.3 观察指标

对比不良事件发生率，即有查对失误、跌倒、护患纠纷、医疗仪器故障；对比护理质量，用自制量表评估，针对护理操作技能、基础护理、护理满意度、护理文书书写，总分100分，正向评分。

1.4 统计学处理

统计学软件：SPSS24.0；计数资料：行 χ^2 检验；计量资料： $(\bar{x} \pm s)$ ，行t检验；统计学意义指标： $P < 0.05$ 。

2 结果

2.1 不良事件发生率对比

不良事件相比，试验组出现2例，对照组出现9例，发生率相比，试验组少于对照组， $P < 0.05$ 。

2.2 护理质量

护理质量评分相比，试验组 (90.54 ± 3.15) 分高于对照组 (79.97 ± 5.45) 分， $P < 0.05$ 。

3 讨论

在出现眼部疾病之后，因视力受到影响，故而会使患者对外界环境产生应激反应，同时也会使内心出现严重的不安全感，影响治疗的顺利开展，同时也影响了预后效果^[3]。因此，在眼科护理管理中，为其配合有效的护理安全措施非常有必要。

眼科护理通过强化护理安全管理，可以提高患者在住院过程中的安全感，让其能享受到人性化的护理服务，使患者获得积极的情绪支持，从而提高疾病的康复信心^[4]。在本次研究中，将护理安全用于眼科护理管理中，可以设定护理安全管理目标，根据护理计划，如在日常工作中严格规范护理流程，做好用药安全护理管理，有助于减少不良事件的发生概率，提高护理质量。

综上所述，在眼科护理管理中，运用护理安全措施，其护理效果显著，对提高护理质量具有积极作用，值得推广。

（下转第108页）

高护理质量。

根据研究,以家庭为中心的优质护理有效提高了儿科的护理质量,保证了患儿的治疗效果。该护理模式为患儿提供温馨、舒适的家庭环境,家属参与到护理过程中,让患儿感受到亲人的关怀,有利于安抚患儿的情绪,积极的配合治疗,减少不良事件的发生率^[4]。

综上所述,在儿科护理中实施以家庭为中心的优质护理模式,有利于提高儿科的护理质量,有利于提高护理效果,还能提高患儿及家属对护理的满意度,保证患儿机体的康复。

参考文献:

[1] 王小品,张博,张亚歌,等.以家庭为中心的护理对小儿慢性胃炎的效果及负性情绪的影响[J].国际精神病学杂志,2022,49(4):745-748.

[2] 刘佳,李小红,喻娇,等.以家庭为中心的儿科护理在小儿川崎病护理中的应用效果观察[J].中国现代医生,2022,60(8):178-181.

[3] 方金芳,李冬梅,周进娣.基于家庭为中心的护理模式应用于轮状病毒性肠炎患儿的效果[J].智慧健康,2022,

8(11):183-185,189.

[4] 刘晨,朱丹丹,王彩.以家庭为中心的护理模式对腹泻患儿症状改善、遵医行为及家属满意度的影响[J].临床医学工程,2022,29(5):727-728.

[5] 邓琦,荀珍娣.以家庭为中心的护理干预在小儿哮喘中的应用价值[J].现代养生(上半月版),2022,22(8):1303-1305.

表 2: 两组护理满意度对比

组别	例数	非常满意	满意	不满意	满意度 (%)
实验组	51	50	10	1	50 (98.3%)
对照组	51	43	8	10	51 (83.3%)
χ^2					11.525
P					< 0.05

表 3: 两组护理有效率对比

组别	例数	有效	好转	无效	有效率 (%)
实验组	51	48	12	1	50 (98.3%)
对照组	51	41	10	10	51 (83.3%)
χ^2					11.525
P					< 0.05

(上接第 104 页)

随着医疗技术的不断进步和护理理念的不断更新,结构性心脏病患者中运用综合护理干预的应用发展趋向如下:越来越多的护理团队开始注重结构性心脏病患者的个性化护理,针对不同病情和患者需求制定个性化的护理计划。护理团队开始将护理与患者的自我管理结合起来,培训并帮助患者掌握自我管理技能,提高管理自身疾病的能力。越来越多的新技术被应用于结构性心脏病患者的综合护理中,如智能护理、虚拟现实等技术。综合护理需要多学科、多职业协作,强化团队协作意识,实现资源共享、信息互通,提高综合护理的效果和质量。对患者的评估和随访是综合护理的重要环节,必须严格实施,及时发现问题,制定应对措施,持续跟踪管理患者的病情。应用信息技术,将患者病情数据、护理记录、药物用量等信息实现数据化管理,为优化护理效果提供决策支持。总之,结构性心脏病患者中运用综合护理干预的应用

发展趋向越来越关注患者的个性化护理、护理与患者自我管理的结合、应用新技术、强化团队协作、强化评估和随访、数据化管理等方面,为提高病患生活质量和医疗效果做出积极努力。总而言之,结构性心脏病患者中运用综合护理干预后,可以有效的提升患者生活质量,减少患者负面情绪,整体状况更好。

参考文献:

[1] 孟令媛,孙丹.冰山理论指导下的个体化护理对妊娠合并心脏病孕产妇心功能及妊娠结局的改善效果[J].护理实践与研究,2023,20(2):270-273.

[2] 林淑婉,张红.穴位按摩、耳穴压豆联合情志护理在风湿性心脏病患者中的应用[J].护理实践与研究,2022,19(11):1676-1679.

[3] 黄青菲.人性化护理干预在风湿性心脏病瓣膜术后护理中的价值[J].婚育与健康,2022,28(23):161-163.

(上接第 105 页)

护理^[4]。综合护理模式属于新型护理模式,主张以患者为中心,要求结合患者需求从多方面着手,改善患者的身心状态。

综上所述,老年甲亢合并糖尿病患者应用综合护理模式,效果显著。

参考文献:

[1] 李梅.健康教育及心理护理干预对甲状腺功能亢进症患者负性情绪及生活质量的影响[J].黑龙江医学,2019,43(7):839-840.

[2] 段红伟,朱秀丽,王悦,等.多元化团体互动健康教育

对甲亢患者疾病认知水平及自我管理行为能力的影响[J].中国健康教育,2021,37(4):338-341.

[3] Priyanka Biswas,Amit Kr. Chakraborty,Anumoy Mukherjee, et al.Elevated Vascular Endothelial Growth Factor Level in Association with Mean Platelet Volume Are Emerging Risk Factors for Vascular Complications in T2DM Patients[J].Health,2019,11(11):1542-1553.

[4] 倪妮.饮食护理应用在甲亢并糖尿病患者中的护理作用分析[J].中国医药指南,2020,18(2):270-271.

(上接第 106 页)

参考文献:

[1] 赵美萍.护理安全管理在眼科护理管理中的应用[J].内蒙古医学杂志,2022,54(10):1274-1275.

[2] 吕芳,朱叶.6S 管理模式在眼科护理管理中的应用价

值探讨[J].黑龙江中医药,2021,50(05):328-329.

[3] 李艳葵,吴善霞,陈结玲.护理安全用于眼科护理管理中的作用[J].医学食疗与健康,2021,19(10):127-128.

[4] 李玉莲.护理安全在眼科护理管理中的应用分析[J].中国卫生产业,2019,16(31):59-60.