

临床护理路径在小儿静脉留置针穿刺护理效果观察

袁 洁

湖北省宜昌市五峰土家族自治县儿科 443400

【摘要】目的 临床护理路径在小儿静脉留置针穿刺护理效果观察。**方法** 选择 2021 年 12 月 -2022 年 12 月本院收治小儿静脉穿刺患者 100 例,按随机数表分为两组,对照组 50 例采用常规护理,研究组 50 例采用临床护理路径,对比两组患者护理效果。**结果** 研究组患者并发症发生情况低于对照组,差异具有统计学意义 ($P < 0.05$);研究组患者满意度 94.00% 高于对照组 76.00%,差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。**结论** 临床护理路径运用小儿静脉留置针患者,可减少患者并发症出现情况,从而提高满意度,在临床上具有一定推广价值。

【关键词】 临床护理路径;小儿静脉留置针;穿刺;护理效果

【中图分类号】 R473.72

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2023) 05-122-02

静脉输液是临床常见治疗手段,其中,头皮针和留置针是静脉穿刺常见操作。静脉留置针因穿刺次数少,输液安全性高而被广泛运用,但受患儿自知力差影响,在穿刺过程中易出现挣扎、不安等情况出现,即使穿刺成功,也易造成留置针脱离,故临床需找寻安全、有效的为患者进行静脉穿刺的护理方法^[1]。本研究对 2021 年 12 月 -2022 年 12 月本院收治小儿静脉留置针穿刺患者 100 例采取不同护理方法分析,报告如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择 2021 年 12 月 -2022 年 12 月本院收治小儿静脉留置针穿刺患者 100 例临床资料,按随机数表分两组。研究组 50 例,男女比例 24:26,年龄 1-10 岁,平均年龄 (4.45 ± 2.13) 岁;对照组 50 例,男女比例 25:25,年龄 1-9 岁,平均年龄 (4.42 ± 2.15) 岁。两组基线资料比较,差异在统计学上无意义 ($P > 0.05$),具有可比性。

1.2 方法

对照组采取常规护理:护理人员对患者及其家属进行健康宣讲,提醒患者注意饮食清淡,避免重油重盐;告知患者及时提醒护理人员更换静脉滴注射液。

研究组采取临床护理路径:创建临床护理小组:组建临床护理路径小组,由护士长担任组长,明确组员的职责,对小组内成员进行专业化培训;护理人员对患者进行评估,通

过与患者家属充分沟通,掌握患者情况,并依据患者情况,从实际出发,为其创建临床护理路径。具体措施:护理人员带领患者熟悉医院环境,避免其处于陌生环境而产生的焦虑情绪,减少在穿刺过程中,因哭闹而影响穿刺效果;并保证在在穿刺过程中患者活动受到限制,避免因剧烈活动而导致穿刺不成功;在实施穿刺前与患者家属进行沟通,将穿刺的重要性、目的以及风险等告知患者家属,以保证穿刺成功;护理人员主动与家属讲解穿刺相关知识,积极与其沟通,及时疏导其紧张、抑郁的情绪,避免家属不良情绪影响到患者情绪。

1.3 观察指标和评定标准

对比两组并发症发生情况:包括疼痛、皮下血肿、渗血、感染;对比两组患者护理后满意度:采取问卷的形式进行调查,包括满意、一般、不满意,85 分以上为非常满意;75-85 分为基本满意,65 分以下为不满意。

1.4 统计学处理

SPSS21.0 统计软件处理与分析,计量数据选择 $(\bar{x} \pm s)$ 表示且符合正态分布,以 t 检验差异;计数数据选择 $[\% (n)]$ 代表,以 χ^2 检验差异, $P < 0.05$ 时有意义。

2 结果

2.1 两组并发症发生情况对比

研究组患者并发症发生情况低于对照组 ($P < 0.05$),见表 1。

表 1: 两组患者并发症发生情况对比 $[n(\%)]$

组别	例数	疼痛	皮下血肿	渗血	感染	发生率
对照组	50	4 (8.00)	3 (6.00)	2 (4.00)	2 (4.00)	12 (76.00)
研究组	50	2 (4.00)	0	1 (2.00)	0	3 (94.00)

注:与对照组比较, $P < 0.05$ 。

2.2 两组患者护理满意度对比

研究组患者护理满意度高于对照组 ($P < 0.05$),见表 2。

表 2: 两组患者护理满意度对比 $[n(\%)]$

组别	例数	满意	一般	不满意	总满意率
对照组	50	19 (38.00)	19 (38.00)	12 (24.00)	38 (76.00)
研究组	50	26 (52.00)	21 (42.00)	3 (6.00)	47 (94.00)

注:与对照组比较, $P < 0.05$ 。

3 讨论

静脉留置针穿刺是临床常见操作,该操作因能够减少反复穿刺给患者带来的不适和疼痛,而被广泛运用。对于需进

行输液治疗的患者,受其自身因素限制,难以配合护理人员的工作,故需临床护理干预^[2]。临床护理路径具有目的性,以患者实际出发,为患者提供高标准的护理服务^[3-4]。为此,本文对本院收治小儿静脉留置针穿刺患者 100 例临床资料予以分析。

本研究结果显示:研究组患者并发症发生情况低于对照组,差异比较具有统计意义,临床护理路径运用小儿静脉留置针患者,可减少患者并发症出现情况。究其原因:组建临床护理路径小组,由护士长担任组长,对小组内成员进行专业化培训,通过对护理人员的专业培训增加一次穿刺成功的

(下转第 125 页)

力。采用急诊护理路径的方法可以减少医疗资源的浪费,避免各种不必要的检查和治疗程序。这有利于减少医疗机构的运营成本,同时缩短患者就医时间并促进病床周转。采用急诊护理路径的方法对急性脑卒中患者可能产生积极的影响,包括缩短急救时间、降低并发症率、提高预后、减少医疗资源的浪费等等,可积极推广急诊护理路径,提高急性脑卒中患者的治疗效率和康复水平^[3-4]。急诊护理路径措施的开展,在急诊脑卒中患者及病情急救效率方面应用价值显著,显著缩短了急诊耗时与抢救耗时,优化了病情干预效率,缩短住院时间,提升病情干预效率;通过急诊护理路径措施的开展,进一步优化了急诊脑卒中的急救效率,急救质量,综合性保障了患者病情改善效果的有效优化;相关医学研究结果综合性佐证了急诊护理路径措施的开展,更好地优化了急诊科的工作效率,使得急性脑卒中病情抢救与医疗干预措施开展的应用价值进一步提升^[5]。

综上所述,在提高急性脑卒中病情干预质量方面,落实急诊护理路径干预模式,进一步优化急性脑卒中急诊干预

段的各项措施,使得病情干预效率与干预质量显著改善,有重要的应用价值。

参考文献:

- [1] 蔡雪丹.急诊护理路径对急性脑卒中患者急救时间及预后的影响[J]. 中文科技期刊数据库(全文版) 医药卫生, 2022, 7(1):0053-0055.
- [2] 叶红梅, 徐建如, 王海燕.急诊护理路径对急性脑卒中患者抢救效果的影响[J]. 医药前沿, 2020, 10(28):191-193.
- [3] 黄丽娟, 陈飞霞, 梁秀芳.规范化急诊卒中护理路径对急性缺血性脑卒中治疗时间窗的影响[J]. 饮食保健, 2021, 7(46):224-226.
- [4] 孙毅, 庆萍萍.急诊护理快速通道对急性脑卒中患者救治时间及治疗效果的影响[J]. 中西医结合护理(中英文), 2021, 7(7):100-102.
- [5] 王璐, 马敬.探究急诊护理快速通道对急性脑卒中救治时间及治疗效果的影响效果[J]. 饮食保健, 2021, 5(16):187-187.

(上接第 122 页)

概率,从而减少并发症出现的概率。同时,护理人员对患者进行评估,通过与患者家属充分沟通,掌握患者因疼痛而哭闹的情况,积极寻求解决办法,防止感染、渗血等情况的出现。

本研究结果显示:研究组患者满意度高于对照组,差异比较具有统计意义,临床护理路径运用小儿静脉留置针患者,可提高患者及其家属满意度,在临床上具有一定推广价值。究其原因:护理人员带领患者熟悉医院环境,避免其处于陌生环境而产生的焦虑情绪,减少在穿刺过程中患者配合度差的情况。同时,在实施穿刺前与患者家属进行沟通,将穿刺的重要性、目的以及风险等告知患者家属,积极与其沟通,及时疏导其紧张、抑郁的情绪,避免家属不良情绪影响到患者情绪,可降低患者的抗拒心理,减少穿刺的次数,从而提高患者满意度。

(上接第 123 页)

血气分析等方面进行定期监测,及时发现并预防并发症的发生,如心律失常、心肌梗死扩展和心源性休克等。通过对患者进行心理护理、生理护理和饮食管理等方面的干预,预见性护理可以促进患者的康复,提高患者的生存质量和满意度。预见性护理干预可以根据患者的病情变化,及时调整医疗计划和治疗方案,有效利用医疗资源,减轻医护人员的工作负担,提高医疗效率。通过对患者进行早期干预和有效监测,预见性护理可以减少并发症的发生,降低患者的住院时间和治疗费用,有效降低医疗成本。

急性心肌梗死患者中采用预见性护理干预的未来发展趋势主要包括以下几个方面:随着人工智能技术的不断发展,预见性护理干预将与人工智能技术的融合更加紧密,以建立更为精确和有效的预测模型和干预方案。患者的病情和生理特征各不相同,因此,未来的预见性护理干预将更加注重个性化定制,以提高治疗效果和生存质量。预见性护理干预需要依赖多学科的专业技术支持,未来的发展趋势将更加注重

综上所述,临床护理路径运用小儿静脉留置针患者,可减少患者并发症出现情况,从而提高满意度,在临床上具有一定推广价值。

参考文献:

- [1] 司书红.临床护理路径在小儿静脉留置针穿刺护理效果分析[J]. 中外医疗, 2021, 40(13):110-112+115.
- [2] 杨诗月, 雍彩霞, 席慧菊.临床护理路径在小儿静脉留置针穿刺护理中的应用效果[J]. 检验医学与临床, 2020, 17(07):974-976.
- [3] 林欣.小儿腹泻护理中临床护理路径的应用评价[J]. 广西中医药大学学报, 2022, 25(05):71-73.
- [4] 谭敏, 高玉梅.临床护理路径在小儿支气管炎患者中的效果及对凝血功能的影响[J]. 血栓与止血学, 2022, 28(03):695-696.

多学科协作,以完善患者治疗方案。随着移动医疗技术和远程医疗技术的不断发展,未来预见性护理干预可以通过移动设备和远程医疗平台实现远程监测和诊疗,以提高医疗效率和患者的舒适度。

总而言之,急性心肌梗死患者中采用预见性护理干预后,可以有效的改善患者负面情绪,提升患者护理满意度,整体状况更好。

参考文献:

- [1] 骆淑娥, 戴若竹.预见性护理在急性心肌梗死并发心律失常患者的效果分析[J]. 中国卫生标准管理, 2022, 13(8):175-178.
- [2] 李真.预见性护理在急性心肌梗死合并心律失常患者临床护理中的应用效果观察[J]. 航空航天医学杂志, 2022, 33(12):1499-1502.
- [3] 陈燕青, 郭燕鸿.预见性护理对急性心肌梗死合并心律失常患者预后效果的影响[J]. 心血管病防治知识, 2022, 12(15):68-70.