• 科普专栏 •

阑尾炎手术后需要注意哪些问题?

余 均

仪陇县丁字桥镇卫生院 637634

「中图分类号] R656.8 「文献标识码] A 「文章编号] 2095-7165 (2023) 11-085-01

阑尾炎是一种常见的急性腹痛疾病,手术是治疗阑尾炎的主要方法。但是,手术后的护理和注意事项同样重要。下面是阑尾炎手术后需要注意的问题,希望能帮助患者和家属更好地理解和应对。

- 1. 伤口护理: 手术后,患者的伤口需要进行定期的清洁和更换敷料。家属可以学习正确的伤口护理方法,如洗手后用温水和肥皂轻轻清洁伤口,然后用干净的纱布轻轻擦干,再进行敷料更换。注意观察伤口是否有红肿、渗液或感染的迹象,及时向医生报告。
- 2. 饮食调理: 手术后的患者需要逐渐恢复饮食。家属可以帮助患者选择易消化、低脂、高纤维的食物,如米粥、面条、蔬菜等。避免食用油炸、辛辣、刺激性食物,以免刺激肠道,延缓伤口愈合。
- 3. 疼痛管理: 手术后可能会出现一定的疼痛不适感。家属可以帮助患者按时服用医生开具的镇痛药物,并注意观察疼痛的程度和特点。如果疼痛加重或持续不缓解,及时向医生咨询。
- 4. 活动恢复: 手术后,患者需要逐渐恢复正常的活动。 家属可以帮助患者进行适度的活动,如起床、行走等,但要 避免剧烈运动和过度劳累。根据医生的建议,逐渐增加活动 的强度和时间。
- 5. 注意观察: 手术后,家属可以帮助观察患者的体温、呼吸、心率等生命体征的变化。如果出现发热、呼吸困难、心悸等异常情况,应及时向医生报告。
- 6. 避免感染: 手术后的患者免疫力较弱,容易感染。家属可以帮助患者保持良好的个人卫生,勤洗手,避免接触有传染性的疾病。同时,注意保持伤口的清洁和干燥,避免污染和感染。
- 7. 定期复诊: 手术后,患者需要按照医生的要求进行定期复诊。家属可以协助患者预约和前往医院,及时进行复查和检查,以确保伤口的愈合和康复情况。
- 8. 注意排便情况: 手术后,患者可能会出现排便困难或 便秘的情况。家属可以鼓励患者多饮水、摄入高纤维食物, 如水果、蔬菜和全谷类食物,以促进肠道蠕动和正常排便。 如果出现便秘或排便困难,可以咨询医生并按照医生的建议 进行处理。

- 9. 避免提重物和剧烈运动: 手术后,患者需要避免提重物和剧烈运动,以免对伤口造成压力和拉伤。家属可以帮助患者避免这些活动,并提供必要的帮助和支持。
- 10. 注意药物使用: 手术后,患者可能需要使用一些药物,如抗生素、止痛药等。家属可以帮助患者按时服用药物,并注意药物的剂量和用法。同时,了解患者的药物过敏史和不良反应,及时向医疗团队报告。
- 11. 心理支持: 手术后的患者可能会面临心理压力和焦虑。 家属可以提供情感支持和安慰,与患者进行积极的交流,鼓 励他们表达情绪和需求,帮助他们建立积极的心态和应对策 略。
- 12. 定期复查和随访: 手术后,患者需要按照医生的要求进行定期复查和随访。家属可以协助患者预约和前往医院,及时进行复查和检查,以确保伤口的愈合和康复情况。
- 13. 注意伤口愈合: 手术后的伤口需要逐渐愈合。家属可以帮助患者保持伤口的清洁和干燥,避免碰触伤口,防止感染和伤口裂开。如果出现伤口红肿、渗液、疼痛或伤口裂开的情况,应及时向医生报告。
- 14. 遵循医嘱:家属应该仔细阅读和理解医生的嘱咐,并帮助患者遵循医嘱。这包括按时服药、定期复诊、遵循饮食限制等。如果有任何疑问或困惑,应及时向医生咨询。
- 15. 注意身体卫生: 手术后,患者需要保持良好的身体卫生。家属可以帮助患者进行日常洗漱,保持皮肤清洁和干燥,避免感染的发生。同时,注意定期更换床单、衣物和毛巾,保持环境的清洁和卫生。
- 16. 避免吸烟和饮酒: 吸烟和饮酒会延缓伤口的愈合和康复过程。家属可以帮助患者戒烟和限制饮酒,以促进伤口的愈合和身体的康复。
- 17. 注意情绪和心理健康: 手术后的患者可能会面临情绪 波动和心理压力。家属可以提供情感支持和理解, 鼓励患者 积极面对困难和调整心态。如果患者出现明显的情绪问题或 心理困扰, 应及时寻求专业的心理支持。

家属在阑尾炎手术后的护理中起着重要的作用。通过提供合适的护理和支持,家属可以帮助患者更好地康复和恢复健康。请与医疗团队密切合作,遵循医生的建议,共同努力帮助患者恢复健康。

(上接第84页)

于降低青光眼的风险,勿在暗室内久待,勿一次性大量饮水,勿滥用激素类药物,随时保持心情愉快。

4. 避免过度用眼:长时间使用电脑、手机等电子设备可能导致眼睛疲劳和干涩,进而增加青光眼的风险。适当休息

和调整屏幕亮度有助于保护眼睛健康。

青光眼是一种常见的眼部疾病,对视力造成不可逆的损害。了解青光眼的危害、预防和治疗是保护视力健康的关键。 让我们一起关注青光眼,保护我们的视力健康。