• 科普专栏 •

阴道炎生化检验,患者不可不知的注意事项

陈樱蔚

成都市新津区妇幼保健计划生育服务中心 成都市新津区妇幼保健院 611430

「中图分类号] R446.1 「文献标识码] A 「文章编号] 2095-7165 (2023) 11-083-01

阴道炎是一种常见的妇科疾病,为了准确诊断和治疗, 医生可能会建议进行阴道炎生化检验。然而,有些错误行为可 能会导致检验样本的污染或不合格,影响检验结果的准确性。 下面是一些患者在进行阴道炎生化检验时需要注意的事项。

- 1. 避免性行为: 在进行阴道炎生化检验前,应避免进行性行为,包括性交、使用避孕套、使用润滑剂等。这是因为性行为会导致阴道分泌物的改变,可能影响检验结果的准确。
- 2. 不使用阴道洗液: 在进行阴道炎生化检验前,不要使用任何阴道洗液、护理液、消毒液等清洁阴道。这些产品可能含有化学物质,会干扰阴道的自然环境,导致检验结果的偏差。
- 3. 不使用药物: 在进行阴道炎生化检验前,不要使用任何阴道药物,包括抗菌药物、抗真菌药物、抗炎药物等。这些药物可能会改变阴道的微生态平衡,影响检验结果的准确性。
- 4. 不进行月经期检验: 在月经期间,阴道分泌物的性质会发生变化,可能会影响检验结果的准确性。因此,最好避免在月经期进行阴道炎生化检验。

此外,患者在进行阴道炎生化检验时,还需要配合医生和检验人员的工作,遵循以下几点:

- 1. 遵循采样指导: 在进行阴道炎生化检验时, 应遵循医 生或检验人员的采样指导。正确的采样方法可以确保样本的 质量和准确性。
- 2. 遵循采样时间: 阴道炎生化检验的采样时间通常是在 月经期结束后的第5-10 天。患者应根据医生的建议,在适当 的时间进行采样,以获得更准确的检验结果。
- 3. 遵循采样器具的使用和处理: 在进行阴道炎生化检验时,应使用干净、无菌的采样器具。采样后,应按照医生或检验人员的指示正确处理采样器具,避免交叉感染的风险。
- 4. 提供准确的病史信息: 在进行阴道炎生化检验前,患者应提供准确的病史信息,包括症状、病史、用药史等。这有助于医生和检验人员更好地理解患者的情况,进行准确的诊断和治疗。
- 5. 避免使用卫生巾和阴道塞剂:在进行阴道炎生化检验前,应避免使用卫生巾和阴道塞剂。这些产品可能会干扰阴道的自然环境,导致检验结果的偏差。

- 6. 不进行阴道冲洗:在进行阴道炎生化检验前,不要进行阴道冲洗。阴道冲洗可能会清除阴道内的正常分泌物,影响检验结果的准确性。
- 7. 避免过度清洁: 在进行阴道炎生化检验前,应避免过度清洁阴道。过度清洁可能会破坏阴道的自然环境,导致检验结果的偏差。
- 8. 遵循采样部位:在进行阴道炎生化检验时,应遵循医生或检验人员指定的采样部位。不同部位的采样可能会提供不同的信息,因此正确的采样部位对于准确的诊断和治疗非常重要。
- 9. 遵循采样次数:有时,医生可能会要求进行多次采样 以获得更准确的结果。患者应遵循医生的指示,按照要求进 行多次采样,以确保检验结果的准确性。
- 10. 配合检验人员的操作:在进行阴道炎生化检验时,患者应配合检验人员的操作。遵循他们的指导,保持身体放松,以便他们能够顺利采集样本。
- 11. 避免尿液污染:在进行阴道炎生化检验时,应注意避免尿液的污染。在采集阴道分泌物样本前,应先清洁外阴区域,以防止尿液的混入影响检验结果的准确性。
- 12. 不进行阴道冷却: 在进行阴道炎生化检验时,应避免阴道冷却。阴道冷却可能会导致阴道收缩,影响采样的准确性。
- 13. 遵循采样顺序: 在进行多项检验时, 医生可能会要求按照特定的顺序采集样本。患者应遵循医生的指示, 按照要求的顺序进行采样, 以确保检验结果的准确。
- 14. 不进行阴道灌洗: 在进行阴道炎生化检验前,应避免进行阴道灌洗。阴道灌洗可能会干扰阴道的自然环境,影响检验结果的准确性。
- 15. 遵循采样时间间隔: 在进行多次采样时,医生可能会要求在特定的时间间隔内进行采样。患者应遵循医生的指示,按照要求的时间间隔进行采样,以确保检验结果的准确性。
- 总之,以上注意事项是为了确保阴道炎生化检验的准确性和可靠性。患者应积极配合医生和检验人员的工作,遵循他们的指导和建议。只有这样,才能获得准确的检验结果,为后续的诊断和治疗提供科学依据。记住,合理配合医生和检验人员的工作,有助于确保阴道炎的准确诊断和有效治疗。

(上接第82页)

- 7. 养成良好的生活习惯:规律作息:保持充足的睡眠和规律的作息习惯,避免过度劳累和精神不佳。
- 8. 科学治疗:根据血脂异常的类型和严重程度,医生可能会开具相应的调脂药物。例如,对于高胆固醇血症,首选他汀类药物;对于高甘油三酯血症,可选用贝特类、烟酸类

或 ω –3 脂肪酸制剂;对于混合型高脂血症,可联合使用不同种类的调脂药物。

总之,预防和治疗血脂异常需要采取综合措施,包括合理饮食、增加运动量、控制体重、戒烟限酒、定期体检和治疗原发疾病等。同时要养成良好的生活习惯和科学治疗,以降低血脂水平并降低心血管疾病的发生风险。