

针灸可改善糖尿病周围神经病变，具体原因你了解吗

古巧玲

西昌市中医医院 四川西昌 615000

〔中图分类号〕R246.1

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕2095-7165 (2023) 11-074-02

近年来，糖尿病周围神经病变这一并发症逐渐引发人们的关注。这种病症常常悄无声息地出现在糖尿病患者身上，对患者造成严重的痛苦和不便。在传统医学领域，针灸可以通过刺激特定的穴位，调节人体内的气血和脏腑功能，从而达到治疗疾病的目的。对于糖尿病周围神经病变，中医针灸同样可以发挥独特的优势。



一、了解糖尿病周围神经病变

糖尿病周围神经病变是糖尿病并发症中较为常见的一种，主要由于长期的高血糖状态对神经细胞和血管造成损伤，导致神经传导速度减慢、神经细胞死亡和神经纤维萎缩，症状包括感觉异常、感觉减退或消失，以及运动障碍等。这种并发症多见于老年糖尿病患者，且与血糖控制情况密切相关。

二、针灸可改善糖尿病周围神经病变的原因

1. 促进神经再生：针灸可以刺激受损的神经细胞，促进轴突的再生和修复，从而恢复神经功能。这种刺激可以加速神经信号的传导速度，提高神经系统的敏感性和反应性，从而改善患者的症状。

2. 改善微循环：糖尿病患者由于血糖水平过高，导致血液循环不畅，从而加剧了神经细胞的损害。针灸可以通过刺激穴位，改善微循环，增加血液循环，为神经细胞提供更多的营养和氧气，从而减轻神经细胞的损害。

3. 调节内分泌系统：针灸可以通过调节胰岛素分泌等内分泌系统，从而改善糖尿病患者的血糖水平。当血糖水平得到控制时，神经病变的症状也会得到缓解。内分泌系统的调节还可以改善患者的代谢状况，提高身体的自愈能力。

4. 抗炎作用：糖尿病周围神经病变与炎症反应有关。针灸可以通过刺激穴位，促进抗炎因子的释放，从而减轻炎症反应，缓解疼痛和麻木等症状。抗炎作用可以减轻神经细胞的进一步损伤，促进神经细胞的修复和再生。

5. 改善神经肌肉功能：针灸还可以改善神经肌肉的功能，促进肌肉的收缩和松弛，从而改善患者的运动能力和平衡感。

这种改善有助于提高患者的生活质量和自理能力。

三、针灸治疗糖尿病周围神经病变的方法

1. 普通针刺法：普通针刺法是治疗糖尿病周围神经病变的常用方法。在具体操作中，医生会根据患者的具体情况选择合适的穴位进行刺激，如足三里、三阴交、曲池等。普通针刺法的主要目的是刺激和调节神经肌肉，促进神经再生和修复，改善微循环，缓解疼痛和麻木等症状。每日治疗 2-3 次，每次留针 30 分钟。

2. 电针法：电针法是在常规针灸法的基础上，利用电刺激来增强针灸效果的一种方法。在具体操作中，医生会将针刺入穴位后，连接电针仪，以产生规律的刺激。电针法的刺激强度和频率可以根据患者的具体情况进行调整。电刺激可以促进神经细胞的再生和修复，提高神经信号的传导速度，从而改善患者的症状。每日治疗 2-3 次，每次留针 30 分钟。

3. 温针法：温针法是利用艾灸燃烧产生的热能来刺激穴位的一种方法。在具体操作中，医生会将艾条点燃后插入针柄，通过热能刺激穴位。温针法可以促进血液循环和炎症消退，适用于伴有四肢发凉、畏寒肢冷的糖尿病患者。温热刺激可以扩张血管、促进血液循环，从而改善微循环障碍，缓解疼痛和麻木等症状。每日治疗 2-3 次，每次留针 30 分钟。

4. 针灸联合其他治疗方法：除了以上几种单纯的针灸治疗方法外，还可以将针灸与其他治疗方法相结合，如中药、按摩、穴位注射、耳穴埋豆及中药足浴等等。这些方法的联合应用可以更好地改善患者的症状，提高治疗效果。具体时间根据个体情况而定。

四、针灸治疗糖尿病周围神经病变的注意事项

1. 针灸治疗前需要进行全面的检查和评估，了解患者的病情和身体状况，制定个体化的治疗方案。

2. 针灸治疗需要专业的医生进行操作，以保证治疗的安全性和有效性。

3. 针灸治疗时需要注意针刺的深度和避开血管，避免出现局部外伤或破溃。

4. 对于疾病严重的患者，可以减少局部穴位的刺激，避免出现破溃或外伤。

5. 针灸治疗后需要注意保暖，避免局部受凉，并积极控制好血糖。

6. 针灸治疗需要坚持一定的时间，才能获得较好的治疗效果。同时，针灸治疗也需要结合其他治疗方法，如中药、按摩、拔罐等，以便更好地改善患者的症状。

7. 针灸治疗后需要定期进行复查和评估，以便及时调整治疗方案。

总的来说，针灸治疗糖尿病周围神经病变是一种安全有效的方法。（下转第 75 页）

那些影响胃溃疡的生活行为

杨 阳

蓬溪县中医医院 629100

〔中图分类号〕R573.1 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165 (2023) 11-075-01

胃溃疡是一种常见的胃部疾病，生活中的一些不良行为可能会加重病情。让我们一起了解一下，如何改变这些不良行为，保护我们的胃健康。

首先，我们要注意饮食习惯。不规律的饮食和暴饮暴食是导致胃溃疡的常见原因之一。我们要尽量保持规律的饮食时间，避免长时间的空腹或过度进食。同时，我们要避免摄入过多的刺激性食物，如辛辣食物、咖啡、酒精等，它们可能会刺激胃黏膜，加重病情。我们可以选择清淡、易消化的食物，如米饭、面条、蔬菜等，有助于保护胃黏膜。我们要注意饮食的速度和咀嚼食物的充分程度。进食过快和咀嚼不充分会增加胃部的负担，导致胃酸的分泌增加，从而加重胃溃疡的症状。我们要尽量慢慢进食，咀嚼食物至少 20 次以上，以帮助胃部更好地消化食物。我们要远离不良的生活习惯。吸烟和饮酒是导致胃溃疡的重要因素之一。烟草中的化学物质和酒精都会对胃黏膜造成刺激，增加胃溃疡的风险。我们要尽量戒烟和限制饮酒，以保护胃部健康。

其次，我们要注意情绪的管理。长期的精神紧张和情绪波动可能会对胃黏膜产生不良影响，导致胃溃疡的发生和加重。我们要学会放松自己，采取一些缓解压力的方法，如运动、冥想、听音乐等，有助于缓解精神压力，保护胃部健康。同时，我们也要保持良好的生活习惯，如规律作息、充足睡眠等，有助于维持身心的平衡。我们要避免过度的体力劳动和剧烈运动。过度的体力劳动和剧烈运动会增加胃部的压力，导致胃酸的分泌增加，从而加重胃溃疡的症状。我们要合理安排工作和运动时间，避免过度劳累和剧烈运动，以保护胃部健康。

此外，我们还要避免过度使用非甾体类抗炎药物（NSAIDs），如阿司匹林、布洛芬等，它们可能会对胃黏膜产生不良影响，导致胃溃疡的发生。最后，我们要强调的是，胃溃疡的管理是一个综合性的过程，需要我们的坚持和努力。除了改变不良的生活行为，我们还要遵循医生的治疗方案，如服用抗酸药物、抗生素等。同时，我们也要定期复查和随访，及时向医生汇报病情变化和身体不适。我们还要注意药物的使用。某些药物可能会对胃黏膜产生刺激，导致胃溃疡的发生和加重。例如，非甾体类抗炎药物（NSAIDs）和一些口服类固醇药物。我们要遵循医生的指导，合理使用药物，避免滥用和长期使用这些可能对胃部有害的药物。

我们要强调的是，胃溃疡的管理是一个需要时间和耐心

的过程。除了改变不良的生活行为，我们还要遵循医生的治疗方案，如服用抗酸药物、抗生素等。同时，我们也要定期复查和随访，及时向医生汇报病情变化和身体不适。

在日常生活中，我们要注意一些不良的生活行为可能会影响胃溃疡的发生和加重。通过改变不良的饮食习惯、管理情绪、远离不良生活习惯，注意饮食的速度和咀嚼食物的充分程度，避免过度的体力劳动和剧烈运动，合理使用药物，我们可以保护胃部健康，减少胃溃疡的发生和加重。胃溃疡的管理是一个综合性的过程，需要我们的坚持和努力。除了改变不良的生活行为，我们还要遵循医生的治疗方案，定期复查和随访。通过综合的管理方法，我们可以保护胃部健康，提高生活质量。

除了上述提到的不良生活行为，还有一些常见的错误观念需要补充，以帮助人们更好地理解和管理胃溃疡。

首先，有些人认为胃溃疡是由于吃辣、喝酒等刺激性食物引起的。实际上，刺激性食物可能会加重胃溃疡的症状，但并不是直接导致胃溃疡的原因。胃溃疡主要是由于胃黏膜受到损伤，导致胃酸和胃蛋白酶的平衡被破坏，从而引发溃疡。因此，改变饮食习惯只是胃溃疡管理的一部分，还需要综合考虑其他因素。

其次，有些人认为只有胃疼才是胃溃疡的症状。实际上，胃溃疡的症状可能各不相同，不仅仅局限于胃疼。其他常见的症状包括胃灼热感、胃胀、恶心、呕吐、食欲减退等。有些人甚至可能没有明显的症状，而只是在胃镜检查时才发现溃疡。因此，如果出现胃部不适或消化问题，应及时就医进行评估和诊断。

另外，有些人认为胃溃疡一旦发生就无法治愈。实际上，胃溃疡是可以治愈的。通过合理的治疗和管理，大多数胃溃疡可以得到控制和愈合。治疗方案通常包括抗酸药物、抗生素、胃黏膜保护剂等。同时，改变不良的生活行为和保持良好的生活习惯也是胃溃疡管理的重要一环。因此，对于胃溃疡患者来说，积极治疗和管理是非常重要的。

最后，有些人认为胃溃疡只是老年人的问题。实际上，胃溃疡可以发生在任何年龄段，包括年轻人和儿童。虽然老年人由于身体状况和生活习惯的变化更容易患上胃溃疡，但年轻人也需要关注胃部健康，避免不良生活行为和压力对胃黏膜的损伤。

（上接第 74 页）

效的治疗方法。通过刺激穴位、调节神经肌肉、促进神经再生和修复、改善微循环、缓解疼痛和麻木等症状等多种机制，针灸可以有效地改善糖尿病周围神经病变的症状，提高患者的生活质量和自理能力。然而，针灸治疗需要专业的医生进

行操作，同时也需要结合患者的具体情况进行个体化的治疗方案设计。治疗后也需要定期进行复查和评估，以便及时调整治疗方案。最后，患者在治疗过程中需要保持耐心和信心，积极配合医生的治疗方案，按照医生的建议进行针灸治疗和日常护理。