• 科普专栏 •

血小板减少症: 如何预防出血风险

杨福冬

德阳市人民医院血液科 618000

[中图分类号] R457 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7165 (2024) 01-072-01

血小板减少症是一种常见的血液疾病,患者的血小板数量较低,容易出现出血的风险。为了预防出血并保护患者的健康,下面我们来了解一些预防措施。

血小板减少症患者的血小板数量较低,容易出现出血。 因此,患者和家属应该尽量避免外伤,特别是剧烈运动、激烈 活动或高风险的运动项目。在日常生活中,要注意安全,避 免碰撞、摔倒等意外情况。口腔出血是血小板减少症患者常 见的问题之一。为了预防口腔出血,患者应该保持良好的口 腔卫生习惯, 定期刷牙、使用软毛刷、避免过度刷牙和使用 硬质牙刷。此外,避免使用牙线或牙签等可能导致牙龈出血 的工具。某些药物可能会影响血小板的功能,增加出血的风险。 患者和家属应该咨询医生,了解哪些药物可能会影响血小板 功能,并避免自行使用这些药物。如果需要使用其他药物, 应该告知医生患者的血小板减少症情况。合理的饮食对于预 防出血风险也很重要。患者和家属应该避免食用刺激性食物, 如辛辣食物、酒精等,因为这些食物可能会导致胃肠道出血。 同时,增加摄入富含维生素 C 和维生素 K 的食物,如柑橘类 水果、绿叶蔬菜等,有助于提高血小板功能和减少出血风险。 血小板减少症是一种慢性疾病,患者需要定期复诊,与医生 保持沟通。医生会根据患者的具体情况进行评估和治疗建议, 以帮助患者控制疾病,减少出血风险。血小板减少症可能对 患者和家属的心理产生一定的影响。寻求心理支持和教育可 以帮助患者和家属更好地应对疾病,提高治疗的依从性和心 理健康。过度劳累可能导致身体疲劳和免疫力下降,增加出 血的风险。患者应合理安排工作和休息时间,避免过度劳累, 保持良好的身体状态。保持良好的个人卫生对于预防感染和 出血风险也很重要。患者和家属应注意勤洗手, 避免接触可 能导致感染的环境和物品。剧烈运动和高风险活动可能增加 出血的风险。患者和家属应避免从事剧烈运动或高风险活动, 如激烈的球类运动、攀岩等。除了影响血小板功能的药物外, 一些非处方药和中草药也可能增加出血的风险。患者和家属 应咨询医生或药剂师,了解哪些药物可能会增加出血风险,

并避免自行使用这些药物。在紧急情况下,如出血或受伤, 患者和家属应及时就医,并告知医生患者的血小板减少症情况。医生会根据具体情况采取相应的处理措施。

有关问题也有较多的错误观念需要纠正,具体情况如下:

- 1. 血小板减少症就意味着一定会出血:这是一个常见的误解。虽然血小板减少症患者的血小板数量较低,但并不意味着一定会出血。出血风险的大小取决于多种因素,包括血小板数量、血小板功能和其他凝血因子的状态等。因此,不是所有血小板减少症患者都会出现明显的出血症状。
- 2. 只有完全避免活动才能预防出血:这是一个常见的误解。虽然剧烈运动和高风险活动可能增加出血的风险,但并不意味着患者需要完全避免活动。适度的运动对于身体健康和心理健康都非常重要。患者和家属应该根据医生的建议,选择适合自己的运动方式和强度,并注意避免受伤和外伤。
- 3. 具有口腔出血是血小板减少症的主要问题:这是一个常见的误解。虽然口腔出血是血小板减少症患者常见的问题之一,但并不是唯一的问题。血小板减少症患者也可能出现其他部位的出血,如皮肤、消化道、泌尿道等。因此,患者和家属应该注意全身的出血症状,并及时就医。
- 4. 血小板减少症可以通过饮食或草药治愈:这是一个常见的误解。血小板减少症是一种慢性疾病,目前尚无特效的饮食或草药可以治愈该病。治疗血小板减少症的主要方法是通过医生的指导,使用适当的药物治疗和管理疾病。
- 5. 血小板减少症是一种传染病:这是一个常见的误解。血小板减少症不是一种传染病,它是一种由多种原因引起的血液疾病。它不会通过接触、空气或食物传播给他人。因此,患者和家属不必担心会传染给他人。

纠正这些错误观念对于血小板减少症患者和家属的心理 接受度和治疗依从性非常重要。正确的理解血小板减少症的特 点和预防措施,可以帮助患者更好地管理疾病,减少出血风险。 如果有任何疑问或困惑,建议及时咨询医生或专业医疗人员。

(上接第71页)

5、头痛

颅脑受到损伤之后大脑内部肯定会有一定的反应出现, 所以当颅脑损伤之后,必然会引起头痛的症状,如果疼痛比 较剧烈的话,需要及时的告诉医生。

6、意识障碍

颅脑损伤的患者一般都会出现不同程度的意识障碍,并 且意识障碍能够反映出损伤的严重程度。这种意识障碍主要 的表现就是昏迷,昏迷的时间长短可以判断意识障碍的程度。 如果昏迷时间比较长的话,病人可能已经完全丧失了意识, 这个时候一定要及时的进行急救,如果生命体征也发生了改 变的话,就会时刻影响生命。

7、失语

失语也是颅脑损伤比较容易出现的一种症状,这是比较常见的语言障碍。通常是因为皮质和语言功能的相关区域受到了损伤所导致的。颅脑损伤的患者是会失去记忆的,而且还会出现一些其他的症状表现,给患者的身体造成的影响是很大的。所以在出现颅脑损伤之后一定要积极的去医院进行检查,然后根据颅脑损伤的严重程度,采取相对应的治疗措施。这样才可以更大程度的解决疾病问题。

— 72 — 医师在线 Physician Online