

以循环质控理念为指导的护理风险管理降低骨科住院患者院感发生率的分析效果分析

林 敏

来宾市武宣县人民医院 广西来宾 545900

〔摘 要〕目的：探讨分析以循环质控理念为指导的护理风险管理降低骨科住院患者院感发生率的分析效果。方法：从 2021-2022 年我院外四科收治的骨科住院患者病例中，抽取了 200 例进行研究，随机分为对照组和观察组，分别按照常规护理模式、循环质控理念模式进行实施，两组患者各为 100 例，将感染发生率、护理满意度作为两组研究对象的评价指标。结果：对照组的感染发生率与观察组对比，对照组显然是不具备优势的，组间差异显著， $P < 0.05$ ；两组患者在满意度对比中存在一定差异，即观察组高于对照组，即 98.00%VS88.00%，对比成立，于统计学有意义 $P < 0.05$ 。结论：在护理风险管理方面，循环质控理念具有较高的应用优势，尤其在骨科住院患者当中，其感染发生率较低，有助于患者护理满意度的提升。

〔关键词〕循环质控理念；护理风险管理；骨科住院患者

〔中图分类号〕R473 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165 (2024) 02-123-02

对于骨科收治的患者来说，在疾病的影响下，活动行为的受限比较严重，再加上较长的康复时间，极容易造成患者住院期间负性情绪的产生和出现。而在护理领域，所涉及的风险因素较多，如果某一环节出现差错，极容易引发护理不良事件，从而不利于机体康复水平的提升^[1]，甚至对患者的生命安全造成极大的威胁和挑战。所以为了促进护理工作的顺利进行，必须要保证护理风险管理模式的科学性与有效性，为患者的疾病康复奠定良好的根基。

1 资料与方法

1.1 一般资料

观察组的男女患者例数分别为 50 例、50 例，最低年龄为 5 岁，84 则是最高的年龄，均值主要在 (44.58 ± 5.48) 岁这一区间。对照组的男女患者例数分别为 51 例、49 例，最低年龄为 6 岁，84 岁同样是最高年龄，均值主要为 (45.31 ± 5.91) 岁。比较两组患者的各项资料情况，差异对比性不显著 $P > 0.05$ ，有继续研究分析价值。在纳入标准中，所有患者尚未存在其他严重器质性疾病，同时所有患者和家属均是知情此次研究的，本院医学与伦理研究会拟定知情同意协议^[2]。如果患者符合：①患有认知功能、精神障碍等疾病；②不主动配合、中途退出者等标准，一律不允许纳入此次研究。

1.2 方法

采取常规护理模式为对照组，如加强基础护理、病情观察等措施。在对照组基础上，引入循环质控理念进行护理风险管理模式为观察组，主要包括的措施如下：①护士长应加强风险管理护理小组的制定，并积极宣传和教育循环质控理念的相关知识，如果考核通过，才可以正式运作。②加强护理风险管理方案的制定，将护理评估、护理措施等内容纳入其中，为循环质控护理风险管理模式的构建创造条件。③通过分析不良护理风险事件的发生原因，首先，患者因素：对于骨科住院的患者，行动不便、伤口疼痛等情况都是难以避

免的，促使负性情绪的产生，进而为不良护理事件埋下隐患；其次，护理因素：部分护理人员尚未高度掌握专业知识，对于护理风险事件给患者的危害缺少正确的认知，在协助患者翻身时，各导管脱离及跌倒等情况的发生几率较高^[3]。基于此，在引入循环质控理念的护理风险管理过程中，首先，应重点培训护理人员，积极宣传和推广循环质控理念，将护理人员的操作不断规范化，仔细评估患者的意识状态、耐受程度等因素，并在协助患者翻身时，应合理控制其动作幅度；其次，如果患者的风险因素较高，应加强约束带的正确使用，以此来保证良好的约束效果，并将相应的防护措施进行落实，使患者跌倒和坠床的出现几率降至最低；最后，护理人员应密切沟通和交流患者，加强良好护患关系的构建，并从患者的心理状态出发，体现出心理护理干预的针对性。

1.3 观察指标

将感染发生率、护理满意度作为两组研究对象的评价指标。

1.4 统计学分析方法

采用 SPSS18.0 软件进行统计学分析。计量资料用 $\bar{x} \pm s$ 表示，两组间均数比较使用 t 检验，重复测量资料用方差分析；计数资料用频数和率表示，率的比较采用 χ^2 检验或校正的 χ^2 检验。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 感染发生率对比

观察组的各项感染发生率通过与对照组之间的对比，观察组显然是更低的，对比差异明显 ($P < 0.05$)。如表 1 所示：

2.2 护理满意度对比

观察组在满意度评分上，均比对照组更为优越，其中，观察组为 98.00%，对照组为 88.00%，组间数据 P 值相比存在一定差异 ($P < 0.05$)。如表 2 所示：

3 讨论

当前，针对于我国的骨科患者的护理研究，其探索深度不断增加，就目前而言，护理不良事件较多^[4]，备受医院管理者的高度重视。基于医院管理者的角度，应定期总结日常工作经验，并加强预见性眼光的渗透，深入分析并及时干预

作者简介：林敏 (197605)，性别：女，民族：汉，籍贯：广西来宾武宣，学历：大专，职称：副主任护师，科室：外四科，研究方向：护理。

潜在的危险因素，从而防止护理风险的发生。

循环质控理念的护理风险管理，作为新型的护理模式之一，主要是指循环处理整个护理步骤，结合相应的研究结果^[5]，将护理工作中的护理问题挖掘出来，然后体现出护理干预的可针对性，将护理人员的风险意识提升上来，最大程度地规避护理不良事件。同时，该模式可以使常规护理模式存在的缺陷和限制得到弥补，改变被动化服务模式，实现向主动化护理模式的顺利转变，同时定期培训小组人员，为护理人员专业技能的提升创造有利条件，将人性化护理服务落实到位。此外，在一系列护理干预措施的支持下，可以使患者的负性情绪得以改善，将疾病治疗的依从性提升上来，进而保证患者良好的满意度。

总之，对于骨科住院患者，基于循环质控理念的护理风险管理的应用优势显著，不仅可以有效控制感染发生率，而且对于提升患者的护理满意度也有着极大的帮助。

[参考文献]

表 1 感染发生率对比 [n (%)]

组别	例数	切口感染	泌尿道感染	胃肠道感染	呼吸道感染
观察组	100	2 (2.00)	2 (2.00)	2 (2.00)	2 (2.00)
对照组	100	15 (15.00)	16 (16.00)	15 (15.00)	17 (17.00)
χ^2		5.161	5.461	5.161	5.643
P		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05

表 2 护理满意度对比 [n (%)]

组别	例数	非常满意	比较满意	不满意	总体满意度
观察组	100	85 (85.00)	13 (13.00)	2 (2.00)	98 (98.00)
对照组	100	78 (78.00)	10 (10.00)	12 (12.00)	88 (88.00)
χ^2					5.485
P					< 0.05

(上接第 121 页)

不必要的干预以及并发症，从而改善患者以及家属的满意度^[2]。经过循证护理，护理人员可以依据最新的研究成果以及实践经验，选择最有效的护理方法以及措施，从而改善护理效果。循证护理的依据是科学的研究数据，因此可以更好地指导护理实践，使护理过程更加规范以及科学。每位缺氧缺血性脑病新生儿的情况都可能有所不同，因此应该个性化的护理方案。循证护理强调结合患者的具体情况制定护理方案，在充分解最新研究成果的基础上，依据患者的年龄、病情、发展水平等特点实施个性化的护理，以达到最佳的护理效果。鼓励护理人员持续地收集、总结以及分析护理实践中的数据，以评估护理效果，并及时调整护理措施。经过不断地反思以及改进，可以改善护理质量，使护理更加符合患者的需求以及最新的研究成果。强调护理人员与医生、其他护理人员以及家属之间的有效沟通以及合作。在制定护理计划以及方案时，

[1] 冯晨希, 江恒, 袁敏, 曹洪辉, 杨荟平. 基于循环质控理念的护理风险管理对骨科住院患者医院感染的影响 [J]. 中华医院感染学杂志, 2016, 26(23): 5497-5499.

[2] 陈曦, 安丽, 谷芬, 田丰, 刘丽文. 超声参数静脉管腔横截周长的平方与面积的比值对骨科住院患者下肢深静脉血栓的预测价值 [J]. 临床超声医学杂志, 2023, 25(05): 351-355.

[3] 宁艳婷, 刘富德, 丁俊琴, 耿倩, 鹿青, 于静静, 陈彩真, 李天华. 骨科住院患者预防下肢深静脉血栓护理质量指标体系的构建 [J]. 护理实践与研究, 2022, 19(14): 2118-2124.

[4] 黄艳茹, 吴洪波. 基于循环质控理念的风险管理用于防治骨科住院患者院内感染的效果 [J]. 黑龙江医药科学, 2020, 43(04): 168-170.

[5] 许冬梅. 基于 PDCA 循环质控理念的护理风险管理预防外科住院患者医院感染的临床分析 [J]. 中国医药科学, 2019, 9(07): 175-177+221.

护理人员可以与团队成员共同讨论，并参考最新的研究成果，以达成共识并制定出最佳的护理方案。这种团队合作的方式可以更好地满足新生儿的护理需求，改善整体护理效果。在缺氧缺血性脑病新生儿护理中拥有重要的意义，可以改善护理效果、个性化护理、促进护理质量的改进以及促进团队合作。

综上所述，采用循证护理可以为缺氧缺血性脑病新生儿护理提供科学指导，改善护理质量、个体化护理以及患者满意度，缓解不必要的干预，并促进团队协作。

[参考文献]

[1] 贺倩, 丁慧, 王慧. IMCHB 下的家长参与护理在新生儿缺氧缺血性脑病中的应用 [J]. 齐鲁护理杂志, 2023, 29(3):132-134.

[2] 翟淑贞, 剧松丽. 早期康复护理干预对缺氧缺血性脑病新生儿智力与运动发育的影响 [J]. 临床医学工程, 2023, 30(5):693-694.

(上接第 122 页)

生活质量的影响 [J]. 中国医药指南, 2022, 19 (17): 24-25.

[2] 高普, 雷叶, 张晶. 基于 Heider 平衡理论的护理干预在改善乳腺癌患者心理应激和生活质量中的应用 [J]. 中国肿瘤临床与康复, 2021, 28 (11): 50-51.

[3] 郑生苓, 郑翠玲, 刘文卿. 运动心理睡眠护理干预在乳腺癌患者放疗期间的应用效果观察 [J]. 中国肿瘤临床与康

复, 2022, 29 (16): 42-43.

[4] 田俊英. 延续性护理干预在乳腺癌患者术后护理中的效果研究 [J]. 中国药物与临床, 2023, 21 (15): 27-27.

[5] 岳朝丽, 徐海萍, 孙莉, 等. "互联网+" 护理模式在乳腺癌患者术后淋巴水肿干预中的应用 [J]. 中国护理管理, 2023, 20 (25): 17-18.