

精细化管理对提升手术室护理工作质量的效果分析

张璐

兰州石化总医院 750000

【摘要】目的 探讨精细化管理对提升手术室护理工作质量的效果。**方法** 收集 2021 年 9 月至 2023 年 7 月期间接收的 92 例手术室护理案例，依据情况分为传统组与精细组各 46 例，传统组运用常规护理管理，精细组运用精细化管理，观察不同处理后患者手术室工作效率与手术室护理工作质量评估情况。**结果** 精细组在手术准备时间与患者接送时间等指标上，各项明显少于传统组 ($p < 0.05$)；精细组在无菌操作、护理技能、手术室物资管理、手术室环境等指标上，各项评分明显高于传统组 ($p < 0.05$)。**结论** 精细化管理对提升手术室护理工作质量有一定辅助作用，同时提升手术室护理工作效率，整体情况更理想。

【关键词】 精细化管理；手术室护理；工作质量；效果

【中图分类号】 R473

【文献标识码】 A

【文章编号】 2095-9753 (2024) 03-111-02

手术室护理的精细化管理是一种以提高手术室护理工作质量、保障患者安全为核心的管理模式。它强调对手术室护理工作的每一个环节进行细致、精准的管理，确保手术室的护理工作能够高效、准确地完成。本文采集 92 例手术室护理案例，分析运用手术室护理干预后的效果，具体如下：

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集 2021 年 9 月至 2023 年 7 月期间接收的 92 例手术室护理案例，依据情况分为传统组与精细组各 46 例。传统组中，男：女=25：21；年龄为 29-72 岁，平均 (43.28 ± 4.71) 岁；精细组中，男：女=27：19；年龄为 27-74 岁，平均 (42.09 ± 3.65) 岁；两组患者在年龄、性别与病情等资料上没有明显差异，有对比研究意义。

1.2 方法

传统组运用常规护理管理，精细组运用精细化管理，具体如下：通过对手术室护理工作进行全面分析，制定出一套科学、合理的护理流程。这个流程应该涵盖手术前的准备、手术中的配合以及手术后的护理等各个环节，确保每一个步骤都能够精准、高效地完成。根据手术室的实际情况，合理配置护理人员、设备、药品等资源。确保在手术过程中，护理人员能够迅速、准确地完成各项操作，设备能够正常运行，药品能够及时供应。加强对护理人员的培训和教育，提高他们的专业素养和操作技能。通过定期的考核和评估，确保护理人员能够熟练掌握各种护理知识和技能，为患者提供高质量的护理服务。手术室是一个多科室协作的工作环境，因此加强各科室之间的协作与沟通至关重要。通过建立良好的沟通机制，确保手术过程中能够及时、准确地传递信息，保障手术的顺利进行。建立一套完善的护理质量控制体系，对手术室护理工作进行全面的监督和评估。通过定期的检查和考核，及时发现问题并进行整改，确保手术室护理工作能够持续改进和提高。手术室是医院内感染风险较高的区域，因此精细化管理中必须高度重视感染控制工作。通过制定严格的消毒和清洁制度，确保手术室内环境的清洁和卫生。同时，加强对手术器械、敷料等物品的消毒和灭菌工作，降低感染风险。定期对手术室护理工作进行风险评估，识别潜在的安全隐患和薄弱环节。针对评估结果制定相应的改进措施和应急预案，提高手术室护理工作的应对能力和抗风险能力。

1.3 评估观察

观察不同处理后患者手术室工作效率与手术室护理工作质量评估情况。工作效率观察手术准备时间与患者接送时间等指标。工作质量评分观察无菌操作、护理技能、手术室物资管理、手术室环境等指标，每个指标都是百分制评估，评分越高越好。

1.4 统计学分析

数据运用 spss22.0 软件处理，计数资料使用 $n(\%)$ 表示，采用卡方检验，计量资料运用 ($\bar{x} \pm s$) 表示，采用 t 检验， $P < 0.05$ 具备统计学意义。

2 结果

2.1 各组患者救治恢复速度情况

见表 1，精细组在无菌操作、护理技能、手术室物资管理、手术室环境等指标上，各项评分明显高于传统组 ($p < 0.05$)。

表 1：各组患者救治恢复速度结果 ($\bar{x} \pm s$, 分)

分组	无菌操作	护理技能	手术室物资管理	手术室环境
精细组	92.57 $\pm$ 4.15	91.28 $\pm$ 3.71	93.41 $\pm$ 4.81	95.27 $\pm$ 3.78
传统组	80.42 $\pm$ 5.62	79.65 $\pm$ 2.58	80.54 $\pm$ 3.27	82.41 $\pm$ 2.59

注：两组对比， $p < 0.05$

2.2 各组手术室护理效率情况

见表 2，精细组在手术准备时间与患者接送时间等指标上，各项明显少于传统组 ($p < 0.05$)。

表 2：各组手术室护理效率结果 ($\bar{x} \pm s$)

分组	医生到位时间 (min)	到院至检查时间 (min)
精细组	31.49 $\pm$ 10.97	22.48 $\pm$ 3.71
传统组	49.28 $\pm$ 13.47	31.59 $\pm$ 4.57

注：两组对比， $p < 0.05$

3 讨论

精细化管理对提升手术室护理工作质量具有显著的支持作用，具体体现在以下几个方面：通过精细化管理，手术室护理团队能够严格遵守无菌操作规范，确保手术过程中的器械、敷料等物品始终处于无菌状态。这有助于降低手术感染的风险，保障患者的手术安全。精细化管理要求护理人员不断提升自己的专业技能和知识水平。通过定期的培训和考核，护理人员能够熟练掌握各种手术操作技巧，提高手术过程中的配合度和应变能力。通过精细化管理，手术室物资的管理更加规范、高效。物品摆放有序，取用方便，能够减少寻找

(下转第 114 页)

术中、术后各项精准护理工作有序开展,帮助患者缓解焦虑和抑郁情绪,避免影响治疗效果。常规护理方法逐步暴露多项不足,护理人员结合患者围术期的护理要求将精准护理干预方法应用其中,实际上就是在常规护理的基础上,为患者提供心理护理、预防护理多种更加有效的护理服务。这就要求护理人员具备较强的专业能力,制定术前、术中、术后三个阶段的精准护理干预方案,满足个性化护理要求同时提高患者治疗依从性,进而帮助患者降低并发症发生率、有效改善关节功能。

本次研究显示,研究组患者的术后焦虑评分和抑郁情况均好于常规组,数据差异大,对比性强($P < 0.05$)。研究组患者的整体护理满意度为96.00%,与常规组患者的86.00%相比更高,两组数据差异大,可以比较($P < 0.05$)。由此可见,精准护理干预方法的应用效果比较好,可以更好地帮

助患者改善不良情绪,让患者非常满意护理服务。

综上所述,护理人员为老年股骨颈骨折患者提供优质的护理服务时注重应用精准护理干预方法,对于提高整体护理效果具有重要意义。

参考文献:

[1] 王媛媛.蒙医系统护理干预对围术期老年股骨颈骨折患者心理状况及关节功能的影响[J].中国民族医药杂志,2021,27(05):77-78.
[2] 崔亚珍,钱进霞,张恩历等.系统护理干预对围术期老年股骨颈骨折患者心理状况及并发症的影响[J].实用临床护理学电子杂志,2019,4(26):11+33.
[3] 卢海松,刘学伟.养血祛风颗粒联合润肤保湿乳膏对血虚风燥型银屑病患者皮肤屏障功能相关指标及生活质量的影响[J].中医药临床杂志,2019,31(03):547-550.

表 1: 两组患者心理状态对比(分, $\bar{x} \pm s$)

组别	SAS 评分		SDS 评分	
	护理前	护理后	护理前	护理后
研究组(n=50)	65.33±3.98	46.21±2.36	66.36±5.26	47.21±5.02
常规组(n=50)	65.39±4.25	49.62±3.59	66.25±5.21	51.34±4.59
T 值	1.332	10.665	2.032	11.654
P 值	> 0.05	< 0.05	> 0.05	< 0.05

表 2: 两组患者的护理满意度对比[n(%)]

组别	非常满意(n, %)	满意(n, %)	不满意(n, %)	患者满意度(n, %)
研究组(n=50)	26(52.00)	22(44.00)	2(4.00)	48(96.00)
观察组(n=50)	23(46.00)	20(40.00)	7(14.00)	43(86.00)
χ^2 值				11.256
P 值				0.002

(上接第 111 页)

物品的时间,提高手术效率。同时,对物资的定期检查和补充,能够确保手术过程中不会出现物资短缺的情况。精细化管理注重手术室环境的优化,包括空气质量、温湿度控制、噪音控制等方面。通过改善手术室环境,能够为患者提供更加舒适、安全的手术条件,同时也有助于降低医护人员的工作压力。通过精细化管理,手术室的手术准备流程更加合理、高效。同时,患者接送流程也得到了优化,能够缩短患者在手术室的等待时间,提高手术室的利用效率。这些效率指标的提升,有助于医院更好地应对手术高峰时段,提高手术室的整体运营效率。

总而言之,精细化管理对提升手术室护理工作质量具有显著的支持作用。通过强化无菌操作、提高护理技能、优化

手术室物资管理、改善手术室环境以及提升手术准备时间与患者接送时间等效率指标,可以全面提升手术室护理工作的质量和安全水平,为患者提供更加优质、高效的护理服务。

参考文献:

[1] 朱伟斌,章美燕,胡艳立.膝关节损伤术后感染的危险因素分析[J].医师在线,2024,14(1):69-72.
[2] 魏彬,程智涛,聂善化,等.武警某队属医院收治的骨关节训练伤特点及膝关节损伤的危险因素[J].武警医学,2022,33(11):945-949.
[3] 张丽,原金凤.新兵训练早期膝关节损伤的危险因素分析[J].世界最新医学信息文摘,2022,22(69):74-78.
[4] 田维思.英式橄榄球运动员膝关节损伤特征及预防措施研究[J].当代体育科技,2023,13(30):9-12.

(上接第 112 页)

于“伤筋”范畴,患者机体多表现出筋络瘀滞、血脉凝涩等状态,提示若提供舒筋活络、活血化瘀等对症处理措施可显著改善患者相应临床症状。有学者提出^[1],针对急性腰扭伤患者中医特点给予相应中医护理措施,可与常规临床治疗起到相辅相成的治疗作用,获得更为理想的临床疗效,其中熏蒸可使药物直接送达患处;按摩可局部机体温度上升有利于改善微循环状态;情志护理可显著改善患者相应负面情绪有利于提高其配合治疗积极性及依从性。本文研究可知,对照组经常规护理后疼痛程度、腰部活动度改善效果并不理想;研究组在常规护理基础上加用中医护理后,其VAS量表评分、

腰椎前屈角度均较之前显著改善,此结论与李彩平^[2]研究结果相符。

综上所述,应用常规护理基础上加用早期中医护理配合可显著改善急性腰扭伤患者疼痛程度、腰部活动度,有利于提高其生活质量,值得今后推广。

参考文献:

[1] 李毛霞,陶莹.中医护理在中医院的应用现状调查[J].中华现代护理杂志,2023,16(10):1137.
[2] 李彩平.急性腰扭伤患者早期中医护理干预效果观察[J].中外医学研究,2022,10(18):89-89.