

住院患者静脉治疗护理中应用规范化管理干预措施的效果观察

张颖 柏倩雯^{通讯作者}

苏州市中医医院心血管内科 江苏苏州 215000

【摘要】目的 探讨分析将规范化管理干预措施对接受静脉治疗住院患者实施的效果。**方法** 选取 2022 年 12 月-2023 年 12 月期间于我院接受静脉治疗的 400 例住院患者进行研究,按照信封随机法分组,参照组 200 例接受常规护理管理,研究组 200 例采用规范化管理干预措施。观察对两组的护理管理效果。**结果** 研究组的一次性穿刺成功率较参照组更高,静脉输液并发症发生率较参照组更低,对比均有统计学意义($P < 0.05$)。**结论** 将规范化管理干预措施对接受静脉治疗住院患者实施,能够有效改善对患者的护理管理成效,避免对患者进行反复穿刺,切实保障患者的安全性,防止患者出现相关并发症值得大力推广。

【关键词】 规范化管理干预措施;静脉治疗;一次性穿刺成功率;住院患者;并发症

【中图分类号】 R473

【文献标识码】 A

【文章编号】 1005-4596 (2024) 03-154-02

静脉输液属于临床上常用的给药治疗手段,能够使药物直接进入患者的血液之中,能够有效发挥药物疗效,稳定患者的病情进展。大部分的住院患者均需要接受静脉治疗,在患者接受治疗的过程中,需要对其同步实施良好的护理措施,保证治疗的有序进行,消除其中存在的风险因素,才可以保障患者的安全性,避免出现不必要的矛盾与纠纷^[1]。因此,本文旨在探讨分析规范化管理干预措施对接受静脉治疗住院患者实施的效果。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取 2022 年 12 月-2023 年 12 月期间于我院接受静脉治疗的 400 例住院患者进行研究,按照信封随机法分组,参照组 200 例接受常规护理管理,研究组 200 例采用规范化管理干预措施。研究组的男女比例为 114:86,年龄为 24 到 85 岁,均龄为(51.92±10.37)岁;参照组的男女比例为 111:89,年龄为 22 到 83 岁,均龄为(52.08±10.51)。常规资料对比无统计学意义($P > 0.05$)。

1.2 方法

参照组接受常规护理管理,主要是在对患者穿刺前,需要观察后期血管情况,选择合适的血管与针头,并进行正确的穿刺与封管操作。完成后,做好导管固定,讲解注意事项,定时观察输液情况。

研究组采用规范化管理干预措施,具体内容为:在对患者治疗前,细致核对患者的基本信息,确认患者身份。同时,需要提前准备好药品与器具。在穿刺前,进行皮肤消毒,并根据患者的年龄、血管情况选择穿刺位置,且确保全部操作

遵循无菌化流程。定时观察患者的生命体征和静脉通路情况,及时记录相关数据并进行必要的调整。告知患者不可以擅自调整补液速度,避免触碰穿刺部位,在输液即将完成后,需要及时报告,不可以擅自拔针。在完成治疗后,护士应妥善处理医疗废物,并告知患者相关注意事项。

1.3 观察指标

两组在接受护理过程中,统计对其一次性穿刺成功率。同时,观察后两组的静脉输液并发症(堵管、静脉炎、外渗/渗出、穿刺点红肿)发生情况。

1.4 统计学分析

通过 SPSS22.0 统计学软件分析,百分比表示计数资料,行卡方检验;对计量资料行 t 检验,用均数±标准差表示。 $P < 0.05$ 表明对比存在差异。

2 结果

2.1 一次性穿刺成功率对比

研究组的一次性穿刺成功率较参照组更高,对比有统计学意义($P < 0.05$)。见表 1:

表 1: 一次性穿刺成功率对比 [n/(%)]

组别	n	一次性穿刺成功	一次以上穿刺成功
研究组	200	184 (92.00)	16 (8.00)
参照组	200	170 (85.00)	30 (15.00)
χ^2			4.814
P			0.028

2.2 静脉输液并发症发生率对比

研究组的静脉输液并发症发生率较参照组更低,对比有统计学意义($P < 0.05$)。见表 2:

表 2: 静脉输液并发症发生率对比 [n/(%)]

组别	n	堵管	静脉炎	外渗/渗出	穿刺点红肿	总发生率
研究组	200	2 (1.00)	4 (2.00)	7 (3.50)	13 (6.50)	26 (13.00)
参照组	200	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.50)	3 (1.50)	4 (2.00)
χ^2						17.414
P						0.000

3 讨论

静脉补液治疗能够快速、有效地为患者补充体液与电解质,有利于维持体液平衡和稳定生理功能,且可以直接通过静脉迅速输送药物或营养物质到全身循环系统中,提高了药物的生物利用度和疗效^[2]。同时,静脉补液可以有效地纠正脱水、调节电解质紊乱、稀释毒物等,是急救、手术、重症监护等临床环境中不可或缺的重要治疗手段。在患者接受静脉补液

治疗的过程中,需要对患者采取专业的护理管理措施,保证静脉治疗的有序进行,防止患者出现相关并发症。

规范化管理干预措施是一种有效的管理方法,具有系统性、标准化、持续性以及有序性的特点。这种管理方法能够帮助医院建立明确的管理流程和规范化的工作程序,提高工作效率和质量,降低护理风险^[3]。将该护理管理模式对接受静脉

(下转第 157 页)

新生儿机体抵抗力较低,各脏器及组织尚未发育,容易受到外界环境的影响而患病,属于特殊护理群体,有效的护理可以帮助不仅可以减轻新生儿的生理和心理应激,还可改善其整体健康状况,进而促进他们的生长和发育。常规护理通常是一个标准化的护理流程,所取效果欠佳,相关资料显示:新生儿护理中音乐配合先俯后仰卧位抚触可以优化护理效果,减少新生儿哭闹,促进其生长发育^[2]。

分析表 1 至表 3 数据:研究组家属满意度评分比对照组明显更高,胎便转黄、首次胎便时间比对照组更早,哭闹发生率比对照组低,提示其护理效果更优,原因可能如下:常规护理可能会忽视新生儿个体差异性,难以全面满足新生儿实际需求,且家长在新生儿护理中的参与度不够,故而在应用局限性。而音乐有助于营造舒适、愉悦的氛围,可使新生儿在抚触过程中逐渐放松,同时,音乐也可以成为抚触过程中父母和新生儿之间情感交流的桥梁,增进亲子之间的情感联系;柔和的音乐和温和的抚触可以帮助新生儿放松身心,缓解焦虑和紧张情绪;音乐和抚触可以促进新生儿的神经系统发育,有助于大脑功能的发展和成熟,通过音乐的节奏和抚触的轻

柔动作,可以引起新生儿的注意力,帮助培养其专注能力和感知能力;先俯后仰的运动可以促进新生儿的肌肉和骨骼发育,增强其运动能力和协调性^[3];音乐和抚触可以帮助新生儿放松身心,分散其注意力,在增进亲子关系、舒缓情绪的同时可以有效减少新生儿哭闹情况,提升家属满意度;此外,先俯后仰的运动和抚触有助于刺激新生儿的肠道蠕动,促进排便,对于新生儿首次排除胎便可能具有一定的积极影响。

综上所述,新生儿护理中探讨音乐配合先俯后仰卧位抚触不仅可减少其哭闹问题,还可优化护理效果,提升家属满意度。

参考文献

- [1] 王莉莉, 马永萍, 唐莹莹. 先俯后仰卧位抚触对早产儿高胆红素血症的预防效果及其对身体发育水平的影响[J]. 全科护理, 2022, 20(36):5116-5118.
- [2] 王英婷, 王珊珊, 涂村招. 音乐配合先俯后仰卧位抚触在新生儿护理中的效果分析[J]. 福建医药杂志, 2020, 42(05):163-165.
- [3] 潘俊霞. 新生儿护理行音乐配合先俯后仰卧位抚触的应用效果研究[J]. 系统医学, 2020, 5(16):175-177.

(上接第 153 页)

合组的并发症出现率低于常规组,且患者满意度高于常规组,说明综合护理的应用效果优于常规护理,与徐华的报道一致。

综上所述,综合护理在自发性气胸电视胸腔镜治疗围手术期护理中的应用效果满意,可明显减少并发症,有利于提高患者满意度,值得推广。

参考文献

- [1] 周卫惠. 关于电视胸腔镜手术治疗自发性气胸病房护

理的探讨[J]. 医药卫生:文摘版, 2022(8):199-199.

- [2] 刘红莲, 罗艳琛, 黄芬. 电视胸腔镜手术治疗中青年自发性气胸的临床护理分析[J]. 当代医学, 2021, 21(35):109-110.

- [3] 张杰. 优质护理预防胸腔镜治疗自发性气胸术后并发症效果观察[J]. 健康之路, 2023(4):154-154.

- [4] 徐华. 护理干预对电视胸腔镜治疗自发性气胸患者预后的影响[J]. 中外女性健康研究, 2022(15):154-154.

(上接第 154 页)

治疗住院患者实施,能够确保治疗过程中的流程有序和规范,避免操作失误和医疗事故的发生,提升治疗的安全性和质量^[4]。同时,能够优化医疗资源的利用,提高医疗服务的效率,使患者能够享受高质量的护理服务,保证静脉补液治疗的有序进行。并且,可以提供患者更为专业指导和帮助,增加患者对医护人员的信任感和依从性,从而加速患者的病情康复,并降低治疗风险,防止出现护患纠纷问题,保障医院的健康发展。本次研究结果显示:研究组的一次性穿刺成功率较参照组更高,静脉输液并发症发生率较参照组更低,对比均有统计学意义($P < 0.05$)。

综上所述,将规范化管理干预措施对接受静脉治疗住院患者实施,能够有效改善对患者的护理管理成效,避免对患者

进行反复穿刺,切实保障患者的安全性,防止患者出现相关并发症值得大力推广。

参考文献

- [1] 於克伟, 史潇, 代莉莉, 等. 普通外科住院患者护理服务质量期望水平与满意度的相关性研究[J]. 安徽医学, 2024, 45(02):225-229.

- [2] 冯婷婷, 马伟光, 梁诗聪, 等. 住院病人给药错误发生现状与影响因素的研究进展[J]. 循证护理, 2024, 10(04):636-639.

- [3] 毛金兰. 规范化管理干预措施对住院患者静脉治疗护理质量影响的分析[J]. 婚育与健康, 2023, 29(13):150-152.

- [4] 黄凤, 陈香, 章晓琴. 规范化管理干预措施对住院患者静脉治疗护理质量的影响[J]. 齐鲁护理杂志, 2020, 26(05):95-97.

(上接第 155 页)

本研究通过对 100 例下肢静脉曲张行激光闭合术患者进行护理比较,结果发现行临床护理路径的研究组患者住院天数为(5.7±1.3)天,住院费用为(6234.6±145.5)元,不良反应发生率为 2.0%,这些指标均显著低于对照组。结果证实了对下肢静脉曲张激光闭合术患者实施临床护理路径具有较好效果,值得临床推广应用。

参考文献

- [1] 谭瑛, 钟英, 刘静梅. 临床护理路径在原发性下肢静脉曲张患者围术期的应用效果及安全性研究[J]. 实用临床医药杂志, 2022, 4(19):39-41, 46.

- [2] 简换军. 临床护理路径在下肢静脉曲张手术患者中的应用研究[J]. 内蒙古中医药, 2023, 32(28):128-129.

- [3] 黄晓宇. 临床路径在下肢静脉曲张激光治疗术患者护理中的应用[J]. 齐鲁护理杂志, 2021, 35(17):8-9.

- [4] 邹娣峰. 单纯性下肢静脉曲张患者中临床护理路径的应用体会[J]. 中国伤残医学, 2022, 23(11):164-165.

- [5] 李惠敏. 临床护理路径在下肢静脉曲张患者护理中的应用效果研究[J]. 临床合理用药杂志, 2023, 9(9):154-155.

- [6] 王晓梅. 临床护理路径在下肢静脉曲张手术患者中的应用效果[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2022, 30(36):4668-4670.