

急诊科用药安全知识普及：患者与家属如何确保用药正确无误？

胡春燕

成都市郫都区人民医院急诊科 638001

〔中图分类号〕R96 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-7165 (2024) 05-056-01

在急诊科，用药安全是关乎患者生命健康的重要环节。对于患者及其家属来说，了解用药安全知识，掌握正确的用药方法，对于保障治疗效果和减少医疗风险至关重要。本文将详细介绍急诊科用药安全的基本知识和注意事项，帮助患者和家属更好地参与医疗过程，确保用药的正确无误。

首先，我们需要明确一个观点：用药并非简单的“吃药”或“打针”过程，它涉及药物的种类、剂量、使用时机等多个方面。因此，患者和家属在用药前应当仔细阅读药物说明书，了解药物的名称、作用、用法、用量及可能的副作用。同时，要特别注意药物的禁忌症和注意事项，避免因自身情况不适宜用药而导致不良后果。

在急诊科，医生会根据患者的病情和身体状况开具相应的药物处方。患者和家属应当信任医生的专业判断，但也要主动与医生沟通，了解自己的病情和治疗方案。对于不明白的地方，不要害羞或害怕提问，医生会耐心解答。此外，患者和家属还可以向护士或药师咨询用药方面的问题，他们同样具备丰富的专业知识，能够提供有价值的建议。

在用药过程中，患者和家属需要遵循医生的指导，按时按量服药。不要随意更改药物的剂量或使用时间，以免影响治疗效果。同时，要注意药物的保存方法，避免药物受潮、变质或过期。对于需要冷藏的药物，要确保冷藏设备的正常运行，并定期检查药物的保存状态。

此外，患者和家属还需要关注药物的相互作用问题。在急诊科，患者可能需要同时服用多种药物，这些药物之间可能存在相互作用，影响彼此的疗效或增加副作用的风险。因此，在用药前，患者和家属应当告知医生自己正在使用的其他药物，包括处方药、非处方药以及保健品等。医生会根据这些信息调整药物处方，避免潜在的药物相互作用风险。

除了药物相互作用外，患者和家属还需要注意药物与食物的相互影响。有些药物需要在饭后服用以减少胃肠道刺激，而有些药物则需要空腹服用以保证吸收效果。因此，在用药前，患者和家属应当了解药物的饮食要求，并遵循医生的指导进行饮食调整。

在急诊科，患者和家属还需要关注药物的过敏反应问题。虽然大多数药物在正常使用下是安全的，但仍有少数患者可能对某些药物产生过敏反应。这些过敏反应可能表现为皮疹、呼吸困难、喉头水肿等严重症状。因此，在用药前，患者和

家属应当告知医生自己的过敏史，以便医生在选择药物时避开可能引起过敏的药物。同时，在用药过程中，患者和家属应当密切关注自己的身体反应，一旦发现过敏症状，应立即停止用药并寻求医生的帮助。

在急诊科用药安全的讨论中，我们不仅要关注正确的用药知识和实践，还需要警惕一些常见的错误观念。这些错误观念往往源于对药物和医疗知识的误解或片面理解，可能给患者和家属带来不必要的困扰和风险。

一种常见的错误观念是“药越贵越好”。很多人认为价格高的药物一定比价格低的药物更有效，更安全。然而，药物的疗效和安全性并不完全取决于价格，而是取决于药物的成分、剂量、适应症以及患者的个体差异。因此，在选择药物时，患者和家属应该更关注药物是否适合自己的病情和身体状况，而不是单纯追求价格高低。

另一个常见的错误观念是“多吃药能快速治愈”。有些人认为，只要加大药物剂量或增加用药种类，就能更快地治愈疾病。然而，药物的疗效并不是简单的剂量累加，过量或滥用药物可能导致副作用增加，甚至产生新的健康问题。因此，患者和家属应该严格遵循医生的用药指导，不要随意增减药物剂量或种类。

还有一种错误观念是“中药比西药更安全”。虽然中药在某些方面具有独特的疗效和优势，但并不意味着中药就没有副作用或风险。中药的成分复杂，可能与其他药物产生相互作用，也可能对某些人群不适用。因此，在使用中药时，同样需要遵循医生的指导，了解药物的成分、剂量和可能的副作用。

此外，有些人认为“只要没有不适，就可以不用药”。这种观念也是错误的。有些疾病可能没有明显的症状，但如果不及时治疗，可能会逐渐加重或引发其他并发症。因此，即使没有明显的不适，也要根据医生的建议和病情需要，按时按量用药。

我们要强调的是，用药安全是医患双方共同的责任。患者和家属需要积极参与医疗过程，了解用药知识，遵循医生的指导；而医生则需要充分了解患者的病情和用药史，为患者开具合适的药物处方，并提供必要的用药指导。只有医患双方共同努力，才能确保用药的正确无误，保障患者的生命健康。

（上接第 55 页）

但是现阶段还存在部分问题，需要进行治疗之后才可以进行手术的患者；③患者有内科以及外科的病症，不能接受手术；④患者本人有较强的不接受手术治疗的意愿。而其中进行药物治疗时，主要用药种类为以下几种：①丹那唑；该药物因

具备较为微弱的雄性激素，所以可以起到治疗效果。需要患者连续服药六个月的时间。可能会出现副作用，表现为体重增加、出汗等，再停药二至六周后便可以自行恢复。②棉酚；该药物主要是针对于卵巢，但是对于垂体并无抑制作用。该药物在停药后卵巢的功能便会恢复。